



暈車嘔吐治療劑

BT-005
內衛藥製字第00055號
Code No.:38031

暈速寧[®]

Bet[®]

Tablets



3.98cm

時代愈進步，人們對海、山、溫泉等的旅行倍感興趣，但相當多的人（據統計約60%）爲了怕暈車、船、飛機而失去旅行的勇氣，原因在受所乘坐交通工具的搖撼，汽油味和人潮擁擠等以致引起頭暈，甚至嘔吐，英語稱此現象爲“Motion Sickness”。蓋傳到人體的速度將引起內耳興奮，後通過前庭神經而達於延髓，刺激嘔吐中樞。今針對此文明社會人類的一大煩惱，本公司特出品極有效的製劑—暈速寧片。

【成 分】

Meclizine Hydrochloride.....	12.5mg
Chlorpheniramine Maleate.....	1mg
Pyridoxine Hydrochloride (B6).....	2.5mg
Caffeine Anhydrous.....	10mg

【賦 形 劑】

Magnesium Stearate、Lactose、Saccharin Soluble、Sunset Yellow FCF、Hydroxypropyl Cellulose、Calcium Carboxymethylcellulose、Sodium Starch Glycolate、Povidone、Cellulose Microcrystalline。

【藥 效】

Meclizine Hydrochloride：對腦中樞有強力鎮吐作用，乃抑制專司平衡感覺的內耳迷走神經之興奮性，對暈車有卓效。藥效持續時間長達24小時之久。Chlorpheniramine Maleate：爲優良抗組織毒素劑，副作用少，有制吐和抑制胃液分泌作用。Pyridoxine Hydrochloride (B6)：對治皮膚病，口腔炎爲有效之一種維他命。Caffeine：使腦部血液暢流，又可增強其他成分之作用。

【特 徵】

1. 本藥服後立即見效，且藥力持續時間長，可使旅客安心快樂旅行。
2. 本藥爲甜片，旅客隨身攜帶，不必伴用開水，必要時服之，甚爲方便又安全。

【適 應 症】

暈車、暈船之預防及治療、其他原因引起之嘔吐、嘔氣之治療。

【用法・用量】

1. 普通場合：乘車、乘船前1小時服用，成人2片，15~8歲1片，7~5歲1/2片。
2. 妊婦及可能懷孕之婦人服用時應請示醫師。
3. 本藥須由醫師處方使用。

【注 意 事 項】

1. 禁忌症：對本藥過敏或曾有該病歷之患者，禁忌服用。
2. 警告：
 - ①可能發生思睡的副作用，必須告訴病人於服用本藥時不宜開車及操作危險性機械。
 - ②服用本藥時宜避免飲酒，及服用其他中樞神經抑制劑（如安眠、鎮靜、安神劑等）。
3. 慎重投與：對於患有狹角性青光眼之患者、狹窄性胃瀰瘍、幽門十二指腸阻塞、前列腺肥大或膀胱頸阻塞、支氣管性氣喘及心疾患之患者宜慎重投與之。
4. 孕婦之使用：在動物實驗曾有兔唇之致畸胎報告，故孕婦禁用。
5. 授乳婦之投與：本藥一些成分可能分泌於母乳中，故授乳婦之使用，宜衡量利弊，慎重投與之。
6. 孩童方面之使用：其安全性及有效性尚未確立，因此年齡小於12歲之孩童不建議使用。
7. 副作用：偶有思睡、眩暈、視覺模糊、荨麻疹、盜汗、口乾、寒顫、心悸、血壓過低、心動過速、血小板減少、顆粒性白血球減少、鎮靜、噁心、嘔吐、下痢、胸悶、頻尿、排尿困難、厭食等現象。

【保 存 上 之 注意】

1. 本藥應置於小兒伸手不及處。
2. 於25°C以下、避光儲存。
3. 請在有效期限內使用。

【包 裝】

100錠、500錠、1000錠，瓶裝、盒裝。



永信藥品工業股份有限公司

YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號

電話：(04) 26875100

台中幼獅廠：台中市大甲區曰南里工九路27號

2140357