胃・十二指腸潰瘍治療劑


“強 生”妙 治 胃 顆 粒

BENTYLINE GRANULES "JOHNSON"

內衛藥製字第000294號

【來　　歷】Bentyl：係於1947年由Menell研究所之Tilford氏等在研究Atropine代用劑時所發現而創製者，本劑具有Atropine樣之Cholinesterase作用(副交感神經遮斷劑)及直接作用於平滑肌而可緩解痙攣之Papaverine樣之鎮痙作用，經臨床實驗結果證實對於胃・十二指腸潰瘍確具卓越之治療效果。

【化 學 式】β-Diethylaminoethyl 1-Cyclohexylcyclohexanecarboxylate Hydrochloride



$C_{19}H_{35}NO_2.HCl$：345.95

【性　　狀】白色結晶性粉末，易溶於水(1：4)。

【成　　分】每公克(Gm)含有：

Dicyclomine HCl	5mg
Aluminum Hydroxide Gel, Dried	400mg
Magnesium Oxide	200mg
Sodium Lauryl Sulfate	25mg
Methylcellulose	100mg

【賦 形 劑】Colloidal Silicon Dioxide、Corn Starch、Flavour(Orange)、Mannitol、Menthol、Methylcellulose、Saccharin Sodium、Sodium Starch Glycolate、Tartrazine

【藥 理 作 用】本劑具有麻痺副交感神經末梢及弛緩平滑肌之向神經性鎮痙作用，且具有對於平滑肌之直接麻痺之向肌肉性之鎮痙作用，即具有Atropine樣及Papaverine樣之作用，但是並無如使用Atropine常見之副作用，例如口渴、瞳孔放大等情形甚少，其毒性微弱，以白鼠經口服用LD_{50}=625±21mg/kg，又因服用本劑並未被認定具有血液像所見或內臟器官之病理變化，於生體內約85%被分解，殘餘即出現於尿中並於48小時內即可由生體內完全排泄出體外。

【適　應　症】胃・十二指腸潰瘍、胃酸過多症、胃炎、胃痛、潰瘍性及痙攣性大腸炎。

【用法・用量】通常成人每次服用1公克(Gm)，1日服用3次，於飯前或飯後服用之，視症狀可適宜增量，小兒劑量視年齡酌減。本藥須經醫師處方使用。

【注 意 事 項】**腎衰竭病患長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症(Dialysis Osteomalacia)、透析性腦病變(Dialysis encephalopathy)及低磷血症，應謹慎小心使用。**

【包　　裝】100公克(Gm)；500公克(Gm)　塑膠瓶裝。

Code No.:K-24

強 生 化 學 製 藥 廠 股 份 有 限 公 司

JOHNSON CHEMICAL PHARMACEUTICAL WORKS CO.,LTD.

新 北 市 2 4 1 三 重 區 三 和 路 四 段 7 7 、 7 9 號

訂貨專線：(02)29894756　　FAX：(02)29712579

工廠電話：(02)22878405