"生達" 鎮筋 錠100公絲

Tranzanone *Tab. 100mg "Standard"*

本品主成分Chlormezanone係一種安神劑（Tranquilizer），對中樞神經有選擇性的抑制作用，能緩和輕度的憂慮(Anxiety)情緒，而不會影響正常的意識知覺(Consciousness)，因此有鬆弛骨骼肌及穩定情緒之雙重功效；口服15-30分鐘後，即能明顯地解除症狀，有效時間可達6小時以上，因此本品可適用於骨骼肌肉痙攣、疼痛、情緒不安、焦慮、神經緊張等症狀，誠為一種良好的精神安定劑。

主 成 份：每錠含：

Chlormezanone……100mg

特　　點：1.對中樞神經有選擇性抑制作用，不影響正常意識。
2.有鬆弛骨骼肌及穩定情緒之相乘效果。
3.口服15-30分鐘後，即能解除緊張和憂慮。

適 應 症：1.肌肉之緊張與痙攣所引起之腰酸背痛。
2.錐體外路系症狀所引起的不安、緊張。

用法用量：通常成人每次1-2錠，每日三次，請依照年齡、症狀酌予增減服用。本藥須由醫師處方使用。

注意事項：極少數引起多形性紅斑(erythema multiforme)、Stevens Johnson 症候群和毒性皮膚壞死(toxic epidermal necrolysis)案例被報導。

禁　　忌：對本劑曾有過敏症的患者。

慎重投與：肝、腎障害患者。

副 作 用：a.過敏症：偶而會有發疹、浮腫、紅潮等過敏症狀出現。
b.精神神經系：有時有嗜睡、頭暈、蹣跚、運動失調、頭痛、頭重感、脫力感、倦怠感、偶而會出霧視等症狀。
c.肝臟：偶而會出現黃疸，此時要詳細的觀察，認為有異常時，就要中止使用。
d.消化器系：有時會有噁心、嘔吐、食慾不振、下痢、便秘、口渴等症狀出現。
e.其他：偶而會出現排尿困難。

如有上述副作用出現時，應視實際情況做減量或中止服用等處置。

對妊婦、授乳婦的投與：對於妊娠中的投與尚未確立安全性，所以對於妊婦或有妊娠可能性之婦人，除了判斷其在治療效果超過危險性時，才能給與投與。對於授乳婦如非必要時，請勿投與。

相互作用：本品與Phenothiazine系、Barbiturates系等中樞神經抑制劑及Monoamine Oxidase inhibitor或飲酒時，可能會因相互作用而增強其作用，因此最好不要併用，如萬不得已須併用時，應注意減量投與。

其　　他：會引起嗜睡及注意力、集中力、反射運動能力等低下，所以本劑投與中的患者，注意不要從事駕駛汽車等有危險性的機械操作。

防濕、遮光、室溫保存。

賦 形 劑：Potato Starch、Lactose、Polyvinylpyrrolidone K 30、Magnesium Stearate、Sodium Starch Glycolate、Water Purified

包裝：1000錠以下瓶裝，膠箔盒裝

內衛藥製字第000338號　Code. NO. TT-07 2211870

PIC/S GMP藥廠
生達化學製藥股份有限公司
STANDARD CHEM. & PHARM. CO., LTD.
台南市新營區土庫里土庫6之20號