

## "生達" 普利胃片

### Petilac Tablets "Standard"

成分：每一錠中含有：

Methylatropine Bromide.....	0.5mg
Aluminum Magnesium Hydrate.....	250mg
Magnesium Trisilicate.....	150mg
Ethyl Aminobenzoate.....	15mg
Bromvalerylurea.....	15mg
Sodium Lauryl Sulfate.....	5mg

- 藥理作用：**
1. Methylatropine Bromide 係副交感神經抑制劑，具有雙重作用，一方面抑制胃液分泌，使酸度降低，減輕潰瘍面所受之刺激，另一方面即對副交感神經末梢之 Atropine-like 作用，抑制胃運動之作用又能抑制胃腸管之痙攣。
  2. Bromvalerylurea 具有中樞性鎮靜作用，並增強 Methylatropine Bromide 之末梢效果。
  3. Sodium Lauryl Sulfate 減低表面張力，使其他藥物易於均勻分佈於胃黏膜上。同時阻止鹽酸之過多分泌，並刺激黏液分泌。
  4. 本劑使用之抗酸劑為 Aluminum Magnesium Hydrate 和 Magnesium Trisilicate，中和能力及制酸作用，在腸管不被吸收。

綜合以上藥理，知本劑為胃炎、胃痛、胃及十二指腸潰瘍、制酸之綜合治療劑，加上患者的充分合作，即生活正常，飲食定時，避免暴飲暴食，足以期待合理的效果。

**適應症：**胃炎、胃及十二指腸潰瘍、胃痛、胃痙攣、胃酸過多。

**用法用量：**成人每次1~2錠，一日3次，於進餐時或飯前服用。由醫師指示使用。

- 注意事項：**
1. 本藥品含 benzocaine 成分，可能造成罕見但嚴重的變性血紅素血症 (methemoglobinemia) 之不良反應。  
若在用藥後 (通常於2小時內) 發生虛弱、精神混亂、頭痛、呼吸困難，或皮膚顏色呈現蒼白灰色或藍色，可能是變性血紅素血症之症狀，請立刻停止用藥，並且諮詢醫師。
  2. 本藥品勿大量或大體表面積使用，儘可能以可達預期療效之最少劑量使用。
  3. 對 benzocaine 成分藥品過敏之病人請勿使用。
  4. 本藥品應小心謹慎用於兒童。
  5. 民眾在貯放該類藥品時，應放置於兒童無法觸及處，以免誤用藥品。
  6. 除非在醫療專業人員的建議及監督下，該類藥品勿使用於2歲以下之嬰幼兒，成人亦應遵循仿單 (藥品說明書) 相關內容使用。倘若於用藥期間有任何不適或疑問，應立即就醫。
  7. 腎衰竭病患長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症 (Dialysis Osteomalacia)、透析性腦病變 (Dialysis encephalopathy) 及低磷血症，應謹慎小心使用。

**賦形劑：**Lactose, Starch, Peppermint Oil, Hydroxypropyl Cellulose, Magnesium Stearate, Water Purified

**包裝：**120錠盒裝、1000錠瓶裝。

內衛藥製字第000862號 Code No. TP-10 2211660

**貯存：**25°C 以下室溫存放。



PIC/S GMP藥廠

生達化學製藥股份有限公司

STANDARD CHEM. & PHARM. CO., LTD.

台南市新營區土庫里土庫6之20號