

綜合感冒劑

內衛藥製字第000863號

嗽都寧液

Sautolin Solution

【成 分】本品每1ml中含有

Noscapine	2mg
DL-Methylephedrine Hydrochloride	1.3mg
Guaiacol Glyceril Ether	5mg
Chlorpheniramine Maleate	0.25mg

【適應症】

緩解感冒之各種症狀(流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咳嗽、喀痰)。

【用法、用量】

一日3次，成人每次10ml，12歲以上適用成人劑量。9歲以上未滿12歲，適用成人劑量之1/2，6歲以上未滿9歲，適用成人劑量之1/3，未滿6歲之兒童，請洽醫師診治，不宜自行使用。

醫師藥師藥劑生指示藥品。

【注意事項】

- (1)為防止兒童誤食請妥善保管。
 - (2)避免陽光直射，宜保存於陰涼之處，儲存於25°C以下。
 - (3)除非有醫師藥師藥劑生指示，請注意下列事項：
 - (一)孕婦及授乳婦不建議自行使用。
 - (二)服用本藥時不得併服其他藥品。
 - (4)勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。
 - (5)本藥使用前須振搖均勻，並使用廠商所附量器量取藥量。
 - (6)不得併服含酒精飲料。
- 【警語】
- (1)服用後，若有發疹、發紅、噁心、嘔吐、食慾不振、頭暈、耳鳴、喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊等症狀時，應停藥立即就醫。
 - (2)除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：
 - (一)6歲以下不建議自行使用。
 - (二)曾經因本藥引起過敏症狀者不得使用。
 - (3)患有肝、腎疾病或其他重大疾病之患者，服用本藥前，應先請教醫師藥師藥劑生。
 - (4)除非有醫師藥師藥劑生指示，不得併用其他綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鼻炎藥物或抗過敏藥及解熱鎮痛等藥物。
 - (5)若咳嗽持續達一星期以上，或若有發燒、腰痙、疹子或持續性頭痛、應停藥立即就醫。
 - (6)吸菸、慢性阻塞性肺疾病患，如氣喘、慢性氣管炎或肺氣腫所引起之持續或慢性咳嗽患者，請勿自行使用本藥。
 - (7)不要服用超過建議劑量，因高劑量會產生焦慮、暈眩或失眠，兒童可能會產生躁動。
 - (8)不要服用本藥超過七日。
 - (9)服用本藥後，如果症狀沒有改善，或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日，應停藥立即就醫。
 - (10)服用本藥後，如果喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐，應停藥立即就醫。

(11)本藥含抗組織胺類成分，應注意下列事項：

- (一)服用本藥後，可能引起嗜睡現象，駕車或操作危險器械時要小心。不要合併飲用含酒精之飲料，亦不要服用安眠藥、鎮靜劑之類的藥品。
- (二)除非有醫師藥師藥劑生指示，下列病患請勿服用本藥：青光眼、肺氣腫、呼吸急促、或呼吸困難、因前列腺腫大引起之排尿困難等。

(12)本藥含支氣管擴張成分，除非有醫師藥師藥劑生指示，有心臟病或高齡者不得服用本藥。

【包裝】

10~4000毫升玻璃瓶裝

委託者 三東生物科技股份有限公司 台南市佳里區禮化里247號

製造廠 龍杏生技製藥股份有限公司 台南市佳里區嘉福里115之1號