普治使可 糖衣錠

BUTYSCOL S.C. Tablets

本品係爲選擇性的副交感神經節阻斷劑，對於因緊張、焦慮等因素所引起的消化系統或泌殖系統上平滑肌痙攣或蠕動過快等異常症狀，有強而迅速的緩解作用。而且本品之副作用遠比其他同類藥物小（其對唾液分泌、心臟、眼睛及汗腺的抑制作用，分別爲阿托品的1/50，1/30，1/500，1/1000），故患者可安心長期服用。

成　　分：每錠中含有：
Scopolamine N-butyl bromide …… 10mg

適 應 症：胃、十二指腸潰瘍、胃炎、十二指腸炎、賁門痙攣、幽門痙攣、膽石痛、膽管痙攣、尿路結石痛、痙攣性月經困難症。

用法用量：通常成人 1 次 1～2錠、 1 日 3 次。 6～12歲小孩 1 次 1 錠， 1 日 3 次。
本藥須由醫師處方使用。

注意事項：1.下列患者嚴禁使用本藥：綠內障、前列腺肥大且排尿困難者、重篤心疾、幽門狹窄及麻痺性腸閉塞。
2.前列腺肥大者得慎重給藥。
3.副作用：
(1) 口渴、視調節障害、胃腸脹滿感、心悸亢進。
(2) 過敏症出現時得停止給藥。
(3) 其他諸如頭痛、頭重感。

賦形劑： Magnesium Stearate、Potato Starch、Lactose、Povidone K-30、Water Purified 、 Gelatin、Sucrose、Carnauba Wax、Talc、 Colloid Silicon Dioxide、Calcium Phosphate Dibasic。

包　　裝：6-1000錠塑膠瓶裝、PTP鋁箔盒裝。

內衛藥製字第000979號　Code No. TB-08　2211150

藥 商：
PIC/S GMP藥廠
生達化學製藥股份有限公司
STANDARD CHEM. & PHARM. CO., LTD.
台南市新營區土庫里土庫6之20號

製造廠：
PIC/S GMP藥廠
生達化學製藥股份有限公司二廠
STANDARD CHEM. & PHARM. CO., LTD.
台南市新營區開元路154號