抗 組 織 胺 • 鎮 暈 劑

BE02-

“強生”縮水蘋果酸氯芬尼拉明錠 8毫克

CHLORPHENIRAMINE MALEATE TABLETS 8mg “JOHNSON”

內衛藥製字第 001774 號

【成　　分】每錠含有：

Chlorpheniramine Maleate……..……..8mg

【賦 形 劑】Brilliant Blue FCF、Starch、Lactose、Magnesium Stearate、Povidone K30

【適 應 症】緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀（流鼻水、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢）及過敏所引起之搔癢、皮膚癢疹，預防或緩解動暈症（暈車、暈船、暈機）引起之頭暈、噁心、嘔吐、頭痛等症狀。

【用法·用量】用於抗過敏時，通常成人一天 3~4 次，每次服用 1/2 錠，用於鎮暈時，於搭乘飛機、汽車、船之前 30 分鐘、30~60 分鐘或 60 分鐘使用，可再依藥物之作用時間，給予維持劑量，通常成人一天 3 次，每次服用 1/2 錠，6 歲以下不建議自行使用。

本藥須由醫師處方使用。

【副 作 用】思睡、倦怠感、口乾，偶有視覺上之困擾，偶見興奮反應（以幼兒及老年人較常見）。

【注意事項】1. 須置於小孩接觸不到之處。

2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。

3. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。

4. 勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。

【警　　語】1. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，請不要使用本劑。

2. 除非醫師處方，嚴重之代謝性肝腎疾病患者不得使用。

3. 老年人應小心使用本劑，3 歲以下不建議服用本劑。

4. 如有呼吸之毛病或慢性支氣管炎、青光眼、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難或因前列腺腫大引起之排尿困難患者，請勿服用本劑。

5. 服用本劑時不得與酒精性飲料合用。

6. 除非有藥師、藥劑生或醫師指示，不得併用鎮靜劑或安眠劑等。

7. 服用本劑後，勿駕車或操作危險器械。

8. 如需服用超過兩劑以上，必須至少間隔 4 小時。

【包　　裝】3~1,000 錠　塑膠瓶裝、PTP 鋁箔盒裝。

【儲　　藏】本藥應儲存於 25℃以下緊密容器，避光貯存。

Code No.：E-02

強生化學製藥廠股份有限公司

JOHNSON CHEMICAL PHARMACEUTICAL WORKS CO., LTD.

新北市 241 三重區三和路四段 77、79 號

訂貨專線：(02)29894756　FAX：(02)29712579

工廠電話：(02)22878405