

肌肉弛緩劑

“強生”抑炎錠 200毫克

MUSCOL TABLETS 200mg “JOHNSON”

內衛藥製字第001790號

- 【成分】** 每錠含有：
Chlorzoxazone 200mg
- 【賦形劑】** Brilliant Blue FCF、Corn Starch、Lactose Monohydrate、Magnesium Stearate、Polyvinylpyrrolidone K30、Primojel、Tartrazine Aluminum Lake
- 【作用】** 本劑係中樞性骨骼肌肉疼痛緩解劑，由動物實驗得知本劑主要作用於脊髓水平及腦皮質下區域而抑制因多相神經肌連接部反射弧所致之各種病因學之骨骼肌痙攣，依據臨床試驗結果顯示本劑可減少骨骼肌的痙攣而緩解肌肉的疼痛以及增進肌肉的活動性。
- 【適應症】** 腰痛，關節痛，肌肉痛，四肢痛，顏面神經痙攣，神經痛，風濕病，結合織炎，關節周圍炎，肌炎，腱炎，變形性脊椎症，挫傷，捻挫打撲，斜頸及其他肌肉痙攣，強直、疼痛所引起之諸症。
- 【用法·用量】** 通常成人每次200-500mg，1日服用3-4次，於飯後及睡前服用之。
本藥須由醫師處方使用。
- 【注意事項】** ①一般注意：因會引起睡意，注意力、集中力、反射運動能力等之減低，故服用本藥的患者應注意切勿從事開車等危險器械之操作。②禁忌：對本劑有過敏症之既往病歷患者。③慎重投與：肝臟、腎臟障礙患者。④副作用(a)過敏症：如發生發疹，瘙癢感等時請即停藥，(b)精神神經系：如有發生睡意，頭暈，腳步不穩及倦怠感等症狀時請作減量或停藥等適當之處置，(c)肝臟：罕有引發肝臟機能障礙，應注意觀察，如有異常發生應即停藥，(d)消化系統：可能引起噁心，嘔吐，灼胸，胃停滯，胃部不快感，腹瀉，便秘，心窩部疼痛及胃痛。⑤乳兒、小兒、孕婦及授乳婦之投與：本劑對孕婦、乳兒及小兒之安全性尚未確立，故對孕婦或可能懷孕之婦女以及乳兒、小兒務必判斷其治療上之有益性大於危險性方可慎重投與，又授乳中之婦女希勿使用。⑥相互作用：因本劑與下列藥品併用或飲酒時可能增強相互作用，故請單獨使用，如不得已必須併用時務請注意減量：Phenothiazine 系製劑，Barbituric Acid 誘導體等中樞神經抑制劑及Monoamine氧化酵素抑制劑。⑦其他：本劑之代謝產物會使尿液呈橙色。
- 【包裝】** 100錠；500錠；1,000錠 塑膠瓶裝。



Code No.:F-02

強生化學製藥廠股份有限公司

JOHNSON CHEMICAL PHARMACEUTICAL WORKS CO.,LTD.

新北市241三重區三和路四段77、79號

訂貨專線：(02)29894756 FAX：(02)29712579

工廠電話：(02)22878405