"強生"甲基睪丸素錠 10公絲

METHYLTESTOSTERONE TABLETS 10mg "JOHNSON"

內衛藥製字第001796號

【成　　分】每錠中含有Methyltestosterone----------10mg

【賦 形 劑】Hydroxypropyl Cellulose、Lactose、Magnesium Stearate、Starch

【臨床藥理】內生性雄性素，職司男性器官和第二性徵的發育與維持。這些影響包括：前列腺、精囊、陰莖、陰囊的發育、毛髮的分佈，喉結的增大，聲帶的變厚等。此外它還擁有蛋白質的同化作用及減少蛋白質的異化作用。雄性素可刺激肌肉、骨骼、皮膚和毛髮的生長，並加速長骨末端之骺的閉合；可能引起氮、磷、鉀、鈉的滯留及減少鈣的排泄。當外因性服用雄性素，經由腦下垂體黃體荷爾蒙(LH)的反抑制作用，可抑制內生性睪脂酮的釋放。大劑量的外因性雄性素經由腦下垂體濾泡刺激素(FSH)的反饋抑制作用，亦可能抑制精子的生成。

【適　應　症】男性性機能衰退，男性更年期所致之各症。

【用法用量】通常成人每次一錠，每日服用1~3次。本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】**(1)成人或是青春期的男性病人若發現有異常勃起或持續性的勃起，減少射精量，陽萎或女樣男乳時，要通知醫師。**

(2)青春期的男性病人，接受雄性素治療時，如有遲緩春情發動期的現象，應每六個月檢查骨骼的發育。

(3)偶而會有噁心、嘔吐、皮膚顏色改變，或是踝部腫脹的現象。

(4)有冠狀動脈疾病的病史，心肌梗塞和前發育期的男性要小心使用。

(5)乳癌的病人，使用雄性素會刺激骨質溶解，引起高血鈣症，此種情況下，應停止使用本藥。

(6)長久使用高劑量的雄性素，會引起肝炎性紫斑，及肝炎性贅瘤包括肝細胞癌。

(7)女性病人若有聲嗄、痤瘡、月經週期改變，或是臉上長有更多的毛髮時，應通知醫師。

【副　作　用】**(1)女樣男乳，陰莖加大，增加勃起，高劑量時，可能會有精液過少的現象。**

(2)多毛、男性禿髮、痤瘡。

(3)體液和電解質障礙：鈉、氯、水、鉀、鈣及無機磷的滯留。

(4)噁心、膽汁鬱滯的黃膽、肝功能試驗改變，及非常少的肝細胞贅瘤，及肝炎性紫斑。

(5)抑制凝血因子II、V、VII及X，病人會有伴隨抗凝血劑治療的流血及紅血球增多症。

【禁　　忌】**(1)確認的或疑似的男性前列腺癌或乳癌。**

(2)肝臟損傷的患者。

(3)心臟、腎臟損傷及高血鈣，年紀較老之患者應慎重投與。

【包　　裝】100錠；500錠；1,000錠　塑膠瓶裝。

Code No.:I-05

強生化學製藥廠股份有限公司

JOHNSON CHEMICAL PHARMACEUTICAL WORKS CO.,LTD.

新北市241三重區三和路四段77、79號

訂貨專線：(02)29894756　FAX：(02)29712579

工廠電話：(02)22878405