

抗 生 物 質 製 劑

"台灣東洋"

內衛藥製字第02240號

樂 黴 素 懸濁液用顆粒

"T.T.Y."

LEUCOMYCIN Granules for Suspension

抗生素樂黴素是北里研究所秦藤樹博士等於放線菌 *Streptomyces Kitasatoensis* Hata 所發現之廣領域有效之抗生素質，對於革蘭氏陽性菌，革蘭氏陰性菌之一部份立克次體，大型濾過性毒，螺旋體菌等有抗菌作用

【性狀組成】

本來樂黴素鹽基是有苦味之白色結晶性粉末，不適合於小兒內服用，但本劑是以其誘導體沒有苦味之醯基樂黴素為主劑，有和樂黴素鹽基同樣之抗菌作用，又沒有苦味，適合於小兒服用。

本劑 1g 中含醯基樂黴素 100 mg (力價) 根據抗生素製劑基準，配合矯味料等作成乳幼兒，小兒易服用之顆粒。

【特 長】

1. Leucomycin 是 Macrolide 系之廣領域有效之抗生素物質。
2. 對於各種感性菌有效，尤其是對於葡萄球菌、鏈鎖球菌、肺炎球菌、革蘭氏陽性菌有強力之抗菌作用。
3. 本品性質安定，毒性低，經口投以後，能很快的達到有效之血中濃度。
4. 對於腸內大部份之革蘭氏陰性菌沒有作用故不會因服用後，腸內革蘭氏陰性菌之減少而引起下痢及異常醣酵（所謂 *Candida* 之症及菌交代現象等副作用）及維他命障礙等二次副作用。
5. 對於 Penicillin Streptomycin 及其他抗生素之耐性菌有效，Penicillin 過敏症之患者可放心使用。
6. 小兒服用容易，有新鮮橘子香味，同時水易溶，為小兒科領域中最佳之製劑。

【適 應 症】

扁桃腺炎，咽頭炎，支氣管炎，肺炎，敗血症，骨髓炎，髓膜炎，心內膜炎，耳下腺炎，中耳炎，大葉性肺炎，尿道炎，發疹傷寒。

【用法用量】

小兒每公斤體重每天服用 25~50 mg (力價) 分 4~6 次口服或加水使呈懸濁液服用，可依年齡症狀適宜增量之，本藥須由醫師處方使用。

【貯法及有效期間】

於室溫保存之，自製造後 48 個月內有效。

【包 裝】

500 g m 塑膠瓶裝。

【注 意】

1. 對於 Leucomycin 曾有過敏反應的患者，請勿投與本藥。
2. 副作用：(1)過敏症：偶有發疹、蕁麻疹的現象，應停止用藥。
(2)肝 腸：長期服用，偶有肝障礙的病例發生，要注意觀察。
(3)胃腸道：偶有食慾不振、噁心、嘔吐、軟便或瀉病的情況。
3. 紿予孕婦投藥應注意事項：
對於孕婦投藥尚沒有確定之安全性報告，故除非治療之利益大於妊娠的危險性，否則不要投與本藥。

製 造 廠：  台灣東洋藥品工業股份有限公司
中壢市中華路一段 838 號