

"南光"其西力糖注射液 10% (五碳醣)

Xylitol Injection 10% "N.K."

內衛藥製字第 002322 號

Xylitol 為一種五碳分子多醇醣類，在體內很快地完全被代謝，不與 Insulin 發生關係，因此不影響血糖濃度，同時可防止 Ketone body 生成，並能改善脂肪與蛋白質之新陳代謝作用。

「成分」：Each ml contains：

Xylitol 100mg

「藥理作用」：

1. 為醣類代謝作用之補充劑：Xylitol 為醣類代謝之中間產物，體內組織親和力強，經注射後，很快滲進末梢組織細胞內而被利用。
2. 用以改善糖尿病之症狀：Xylitol 在代謝過程中，不須用到 Insulin，不致影響到血糖，同時能供給能量，阻止 Ketone body 之生成，所以臨床上用以改善糖尿病之症狀。
3. 手術出血病人之治療：由於外傷出血引起休克，或由於麻醉外科手術與手術後引起之刺激，都能使體內 Glycogen 加速分解，引起類似糖尿之代謝疾病，因此六碳醣不能使用。而 Xylitol 因能供給足夠之能量防止脂肪與蛋白質不正常之分解現象，故可利用。

「適應症」：

糖尿病時之醣類補充，外傷、麻醉、手術後引起醣類代謝異常時之醣類補充。

「用法用量」：

本藥限由醫師使用。

靜脈注射或靜脈點滴。一次 20~500ml，一天一次或多次，可混合他藥使用，用量由醫師視症狀需要而定。

「注意事項」：

一、禁忌：低張性脫水症之患者。

二、警告：有尿崩症、肝障害、腎障害之患者應慎重投與。

三、副作用：

1. 急速且大量投與時，可能會引起電解質喪失，故需慎重投與。

2. 出現肝障害或腎障害時，應注意注射的速度及投與的劑量。

四、取用時：

1. 運輸過程中，容器可能因受重擊、震動，而致產生破裂、縫隙或瓶塞鬆動，若發現有上述情形時，請勿使用。
2. 若藥液有不澄清、變色、異物或其它異常現象時，請勿使用。

五、輸液套選用及插入法：

1. 請依輸液套使用方法正確使用。
2. 請使用附有過濾裝置之輸液套，導入針應以垂直方式插入橡皮塞，插入後請勿扭轉，以免因針割 (Coring) 產生碎片。
3. 使用前請再檢視，確定無異物後，方可使用。

「儲藏」：

本品應存放於陰涼處所。

「包裝」：

20 公撮安瓿裝，100 支以下盒裝。

100 公撮玻璃瓶裝，100 支以下盒裝。



南光化學製藥股份有限公司
台灣 台南縣新化鎮中山路1001號
TEL:06-5984121(代表) FAX:
06-5972033