



內衛藥製字第 002368 號

必利黴素 膠囊

BILIMYCIN capsules

本品係由 Tetracycline 與 Glucosamine 配合組成使抗生素在血中濃度大大地增強，使 Tetracycline 易於被吸收，因此使用少量的 Tetracycline 就可達血中高濃度的抗菌功效。

【成份】

Each Capsules contains :

Tetracycline Hydrochloride..... 250 mg

Glucosamine Hydrochloride..... 125 mg

【賦形劑】

Lactose、Magnesium Stearate

【膠囊成份】

Gelatin、Sodium Lauryl Sulfate、Titanium Dioxide、Brilliant Blue FCF、Tartrazine

【適應症】

支氣管炎、肺炎、咽喉炎、扁桃腺炎、肺膿瘍、腦膜炎、痢疾、膀胱炎、腎盂炎、淋病、梅毒、腦炎、流行性腮腺炎、蓄膿症、中耳炎、腹膜炎、亞急性細菌性心內膜炎。

【用法用量】

本藥須由醫師處方使用。

膠囊—成人一般每天 1 Gm(4 粒)分 2~4 次服用，連續至熱度或症狀退消後，尚需連服 1-3 天，以避免引起復發可能。

兒童每公斤體重每日 25 mg 分 4 次服用。

(Tetracycline) 【注意事項】

- 一、本抗生素作為口服或注射時。可能導致嚴重之肝或腎臟變壞，大量作為注射時常能導致死亡，尤以孕婦之感染治療時為然，故在使用本劑前及使用期間應作肝腎機能血尿痰檢查在發現對肝腎有副作用發生時，當即停止使用或予適當治療，則常可恢復正常。
- 二、如患者腎臟機能有障礙時，僅以口服或非口服常用劑量，即可導致藥物體內蓄積量超過及可能發生肝臟中毒，在此狀況下，應使用比正常量為少之劑量，如治療須延長，應注意測定血清中四環素濃度。

三、發現有過敏現象時即停止使用。

四、治療期間同時觀察有否促成抗生素通有之無感受性之生長 (尤以白色念珠菌之感染)，如發現則酌量服用或借他法防止之。

【包 裝】

8~1000 粒盒罐裝。

瑞士藥廠股份有限公司
SWISS PHARMACEUTICAL CO., LTD.
新市廠：台南市新市區中山路182號