胃痛、胃痙攣製劑

胃 免 痛 錠

Imenton Tablets

【 成 分 】每錠含

Ethyl Aminobenzoate	40 mg	Ethylpapaverine HCl	8 mg
Extract Scopolia	5 mg	Bromvalerylurea	40 mg

【 作 用 】・Ethyl Aminobenzoate（局部麻醉劑）－阻斷神經纖維傳遞作用，緩解胃腸道之疼痛、刺激性。比 Lidocain 作用時間長。

・Extract Scopolia（抗膽鹼激性劑）－能降低胃腸的運動性和分泌，可用於消化性潰瘍，胃腸、膽道與泌尿道痙攣，緩解刺激性腸的症狀或其他胃腸不適。

・Bromvalerylurea（鎮靜安眠劑）－抑制、降低中樞神經的傳遞。有鎮靜、緩解焦慮、緊張和神經質。

・Ethylpapaverine HCl（平滑鬆弛肌劑）－緩解胃腸和泌尿道的痙攣作用。

・Aluminum Silicate Synthetic（制酸劑）－暫時緩解輕微性胃部不適，灼熱感。

・由於五者之相乘作用，對胃、腹、膽、腎及十二指腸之痙攣及疼痛有良好的治療效果。

【 適 應 症 】胃痛、腹痛、胃痙攣、膀胱痙攣、膽石痛、疝痛、腎疝痛、胃潰瘍及十二指腸潰瘍之痙攣、食傷、痙攣性咳嗽。

【用法用量】成人一回 3-4 錠，一日 3 回服用，8～15 歲一回 2-1 錠半，4～7 歲 1 錠服用。

＊本藥須由醫師處方使用＊

【注意事項】

1. **對已知本劑成分過敏者。**
2. **發生口腔乾燥的現象時，如果需要時，可咀嚼口香糖等，即可獲得緩解。**
3. **服用本劑後，若有視力模糊，眩暈或思睡的話，就不要駕車或操作危險器械。**
4. **對下列症狀需慎重投與，如：青光眼、尿道阻塞、胃道障礙、麻痺性腸隔、重肌無力、裂孔赫尼亞（Hiatal hernia）、氣喘、十二指腸潰瘍、心律不整、甲狀腺亢進、潰瘍性直腸炎。**
5. **本藥品含 benzocaine 成分，可能造成罕見但嚴重的變性血紅素血症(methemoglobinemia)之不良反應。若在用藥後(通常於 2 小時內)發生虛弱、精神混亂、頭痛、呼吸困難，或皮膚顏色呈現蒼白灰色或藍色，可能是變性血紅素血症之症狀，請立刻停止用藥，並且諮詢醫師。**
6. **本藥品勿大量或大體表面積使用，儘可能以可達預期療效之最少劑量使用。**
7. **對 benzocaine 成分藥品過敏之病人請勿使用**
8. **本藥品應小心謹慎用於兒童。**
9. **民眾在貯放該類藥品時，應放置於兒童無法觸及處，以免誤用藥品**
10. **除非在醫療專業人員的建議及監督下，該類藥品勿使用於 2 歲以下之嬰幼兒，成人亦應遵循仿單(藥品說明書)相關內容使用。倘若於用藥期間有任何不適或疑問，應立即就醫。**

【 副 作 用 】**口腔乾燥、視力模糊、怕光、排尿困難、重肌無力、暫時性無味覺、嗜睡、失眠、嘔吐、反胃、便秘、皮膚過敏、蕁麻疹、減少排汗。**

【 警 語 】

1. **服用本藥前：如有青光眼、氣喘、泌尿或胃腸阻塞。**
2. **孕婦或哺乳婦暫勿服用。**
3. **服用抗膽鹼激性劑（Anticholinergics）會引起虛脫，因排汗減少所致。**
4. **應注意下痢的發生，可能是不完整胃腸阻塞性之早期症狀。**
5. **過量時引起頭痛、嘔吐、反胃、視力模糊、瞳孔放大、熱潮、口乾等症狀。治療方法以洗胃、通腸、活性炭或嘔吐。**

【賦形劑清單】Aluminum Silicate Synthetic、Brillient Blue FCF、Magnesium Stearate、Starch、Talc。

【貯存方式】室溫（25℃以下），避光貯藏。

【 包 裝 】6-1,000 錠 鋁箔盒裝及塑膠瓶裝

內衛藥製字第 02640 號

SHINLON 信隆 SPC 藥品

信 隆 藥 品 工 業 股 份 有 限 公 司
Shinlon Pharmaceutical Ind,.Co.,Ltd.
台灣・台南市仁德區中正路三段 269 號