內衛藥製字第 002783 號

氯黴素-C 坐劑

Keromycin-C Suppositories

Chloramphenicol Carbarsone Vaginal Suppositories

綱號：J02

本劑所含氯黴素對淋菌及各種雜菌等廣範圍病原微生物具有抗菌作用，Carbarsone 對陰道滴蟲所引起白帶之治療有效，Benzethonium Chloride 對各種病原菌及念珠菌(Monilia)具有阻止發育之強力作用，至於硼酸，即有一般細菌發育阻止作用。

成分：Each Suppository contains：

Chloramphenicol……50mg(力價)

Carbarsone…… l00mg

Benzethonium Chloride…….lmg

係以 Polyethylene Glycol 為基劑製成之水溶性陰道坐劑，適合日本抗生物質醫藥品基準之「Chloramphenicol Vaginal Suppositories」之規格。

特長：

1.本劑對各種原因所引起之白帶症，能迅速而確實奏效，通常使用本劑二至三次，即可消失白帶感，殺滅陰道內細菌與陰道滴蟲，而得治癒白帶。

2.本劑對女子性病預防亦有顯著效果，如使用方法適當，即能長時間滯留陰道內保持有效濃度，因此一天使用一次，每次一球，即能收效。

3.本劑用法簡便而清潔。

4.本劑為水溶性基劑坐藥，與陰道內分泌液接觸即可溶解，故能迅速擴散其有效物質至陰道內之皺壁以發揮效力。

5.如長期連續使用抗生素，有時會誘起念珠狀菌病症(Moniliasis)，但本劑因配有強力抗念珠狀菌病症作用的 Benzethonium Chloride 故可完全防止之。

適應症：急慢性膣炎，陰道滴蟲引起之膣炎。

用法：本藥須由醫師處方使用。

注意：

陰道滴蟲感染有時在治療後呈現再發症狀，所以使用之際應在不認見其蟲體後再繼續使用數次始可停止。

在月經後之再發比較多，因此月經中亦須繼續使用。

3.對性病預防之使用法，性交前或後用本劑一球插入陰道穹窿部，每次使用一球即可達到預防之目的。

注意：


本劑在陰道內約十分鐘就溶解，性交前使用本劑，至少應於十五分鐘前插入之。為發揮本劑充分之效力起見，性交後亦須長時間使其停留於陰道內。

本劑如在性交後使用，即須於膣洗後即時插入之。

陰道內分泌液不足時，本劑不能溶解，此時可用水將球浸濕後插入，或在本劑插入後以消毒棉花球微濕插入之。

本劑每次使用一球即可。

4.取出說明：取出坐劑撕開一片，然後按下端有V型切痕處如圖示用力撕開，使其至坐劑接觸處即可輕易取出使用。



儲藏法：

1.本劑為吸濕性，使用時方可啟開。

2.為防濕氣，請密蓋儲存於冷暗處。

3.長期保存有變色(呈褐色)可能，但其藥效不變，照用有效。

注意：

1.本劑含有 Chloramphenicol

對新生兒可能導致腹部膨脹、發紺、血管萎縮等副作用，應避免使用。

本劑可能導致顆粒性白血球缺乏病，再生障礙性貧血，服用大劑量會導致紅血球之發育不全，必要時應作白血球、紅血球及其分類計算，遇有變化時應停止使用。

1.插入法(參照附圖)：屈曲腰部將本劑一球用手指頭急速插入陰道內深部(後陰道穹窿部)。必須至手指第三節處。



2.對陰道滴蟲、陰道炎及白帶之使用法，先以本公司出品之安期消毒液(Antiseptol) 400~500 倍液消毒清洗後，將本劑一球插入後陰道穹窿部。為防止流出起見插入消毒棉花，五小時後除去。使用 2~3 次，惡臭及白帶即能消失，炎症亦可漸輕至治癒。

2.本劑非避孕劑而為局部預防治療劑，絕不可經口服。

包裝：100 球以下罐裝、盒裝

中國化學製藥股份有限公司
CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.

總公司：台北市襄陽路 23 號 TEL：(02)23124200

新豐工廠：新竹縣新豐鄉坑子口 182-1 號

Size:130mm　單面內容一律黑色　B 版　93.01.29.