

成藥藥品仿單標籤粘貼表 (二)

C15

藥品名稱	氯黴素顆粒小兒用	申請廠商	
------	----------	------	--

衛生署給證號碼 衛字第 002796 號

78.6.30

內衛藥製字第002796號

中國化學製藥

氯黴素顆粒 小兒用


Keromycin Granule "c.c.p." Pediatric

Chloramphenicol Palmitate Granule

本公司出品之小兒用氯黴素顆粒 (Keromycin Granule) 係以此氯黴素軟脂酸酯為主要成分之美味顆粒，特別適於乳兒幼童之服用。

成分：

氯黴素軟脂酸酯 (Chloramphenicol Palmitate) 具有如下之化學構造，為無味白色或灰白色之結晶，融點為 $89^{\circ} \pm 3^{\circ}\text{C}$ ，難溶於水及石油醚，易溶於酒精、氯仿、苯等。



小兒用氯黴素顆粒係氯黴素軟脂酸酯 (Chloramphenicol Palmitate) 加以適當甘味劑而成。

每 1Gm. 含有 Chloramphenicol (as Palmitate) 125mg (力價)

適應症：

百日咳、赤痢、疫痢、小兒下痢症、傷寒、腸炎、耳下腺炎、流行性腦脊髓膜炎、帶狀疱疹等。

用法：

本氯黴素顆粒 1Gm. 相當於氯黴素 125mg，故可以參照氯黴素用法服用。乳兒幼童每日每 kg. 體重服用 50~100mg. 氯黴素，即體重 10kg. 以下之乳兒每 4~6 小時服用 $\frac{1}{2}$ ~1Gm. 顆粒，10kg. 以上之小孩每 4~6 小時服用 1~2Gm. 顆粒。進入恢復期以後可視症狀酌量減少。

(參照用量表)

有效期間：製造次月起 48 個月。

注意事項：

1. 本劑中含有氯黴素服用時請注意下列事項：
 - ① 本劑對新生兒可能導致腹部膨脹，發紺，血管萎陷，核黃疸等副作用，應避免使用。
 - ② 本劑可能導致粒性白血球缺乏病，再生障礙性貧血，服用大劑量會導致紅血球之發育不全，應經醫師處方使用。必要時並應作白血球、紅血球及其分類計算，遇有計數變化時，應停止使用。



中國化學製藥
氯黴素
KEROMYCIN
GRANULE

氯黴素軟脂酸酯
-Chloramphenicol Palmitate

Each Gm. Contains.
Chloramphenicol (as Palmitate) 125mg

適應症·用法·用
請詳閱說明書後使
注意：

1. 本藥含有氯黴素，請詳閱說明書後使
2. 本藥須遵照醫師指示服用，請注意有效期間。

內衛藥製字第002796號
Lot No.
製造日期
有效日期