

鎮痙、鎮咳劑  
**必樂平注射液**  
**Bartropin Injection**

成 分：

Each Amp. (1 ml.) Contains:

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Phenobarbital J.P.              | 60 mg.   |
| Caffeine & Sodium Benzoate J.P. | 30 mg.   |
| Atropine Sulfate J.P.           | 0.25 mg. |

適應症：

小兒中毒所引起之痙攣、疫癆引起之痙攣、癲癇、腦膜炎與氣喘發作時之痙攣等之鎮痙。

用 法：

通常成人一次 2~3 ml., 小孩一歲以下一次 0.2~0.3 ml., 二至五歲 0.5~1.0 ml., 六歲以上 1.0 ml. 注射於皮下或肌肉內。疫癆或其他激烈發作時，於三至四小時內注射 3.0~5.0 ml. 亦無妨害。

**注意事項：**

- 1.本藥限由醫師使用。
- 2.本劑為劇藥，使用時請注意下列事項：
  - ①使用本劑時，請勿飲酒。
  - ②老年人如患有嚴重之心臟病者，如需使用本劑請醫師特別注意。
- 3.本劑於冬天寒冷時可能析出結晶，此時可於溫水中加溫俟其溶解後使用。
- 4.與水滲和時，由於溶解度之變化，可能發生沉澱，因此須避免與其他注射液混合使用。
- 5.本劑有習慣性須加注意。

包 裝：1 ml. 10A, 20A, 50A, 100A, 200A 裝

**賦形劑：**

Propylene glycol, Benzyl alcohol, Water for Injection



**中國化學製藥股份有限公司**

CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.

總公司：台北市襄陽路 23 號 TEL : (02)23124200

新豐工廠：新竹縣新豐鄉坑子口 182-1 號 ⑧