

普力安寧錠

Preanin Tablets

- 【成分】 每錠含有
Prednisolone 5mg
- 【適應症】 急性感染疾患(與抗生素併用)蕁麻疹、灼傷、創傷的休克、風濕性關節炎、氣喘症、皮膚炎。
- 【用法用量】 成人一日服用三片~四片，急性病症一日四~六片，俟症狀減退後每隔四~五天減輕一日劑量半片至一片，直減至最低維持或病症完全消失為止。

本藥須由醫師處方使用

- 【注意事項】 1.急性慢性感染症，使用時請同時併用適當的化學療法劑或抗生素藥品，以治療感染疾病。
2.對消化管障礙如胃腸潰瘍務請特別注意。
3.因主要副作用為引起浮腫，血壓上昇，尤以腎臟疾患及高血壓患者應注意。
4.糖尿病患者使用時，請注意增加 Insulin 之用量。
5.對於有精神病因素者，多加注意。
6.服用本劑期間，請充分補充蛋白質。

【絕對禁忌】 精神病，消化管潰瘍，抗生物質，不能奏效之需要手術之感染性疾患。

【比較禁忌】 心臟血管障害，腎機能不全，糖尿病，閉塞靜脈炎，骨粗鬆病、痙攣性疾、結核。

【賦形劑清單】 Starch、Gelatin、Lactose、Magnesium Stearate、Microcrystalline Cellulose 101、Saccharin Sodium、Sodium Starch Glycolate、Starch Paste、Talc

【包裝】 1000 粒塑膠瓶裝

【儲存方式】 室溫 25°C 以下，避光儲存

內衛藥製字第 003251 號



信隆藥品工業股份有限公司
Shinlon Pharmaceutical Ind.Co.,Ltd.
台灣·台南市仁德區中正路三段 269 號