

# “應元”健胃散

## Pulvis Stomachicus “Y.Y.”

## 【成 分】

Each gram contains:

Sodium bicarbonate .....	700mg
Gentiana powder .....	300mg

## 【作 用】

Sodium Bicarbonate為制酸劑，可用於中和或吸著過剩胃酸，使酸度降低，多用于治療胃酸過多。  
Gentian Powder：以其苦味、芳香之特性刺激味覺，興奮胃肌，由反射作用使唾液、胃液分泌增加，促使消化機能亢進，增進食慾，被廣用作苦味健胃藥，可用于厭食及消化不良等症。

## 【適 應 症】

緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多。食慾不振、胃腹部膨脹感、消化不良。

## 【用法用量】

成人每次550公絲，一天3次，或需要時服用。

12歲以上，適用成人劑量。

6歲以上未滿12歲，適用成人劑量之1/2。

3歲以上未滿6歲，適用成人劑量之1/4。

3歲以下之嬰幼兒，請治醫師診治，不宜自行使用。

本品成人單次劑量之酸中和能力為5mEq，單次劑量含鈉8.3mEq。

醫師藥師藥劑生指示藥品。



## 【注意事項】

- 1.為防止兒童誤食請妥善保管。
- 2.避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
- 3.除非醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
- 4.勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。

## 【警 語】

- 一、除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：
  - 1.對於牛奶或乳製品耐受度低者，每日服用藥品中之乳糖含量不得超過5g。
  - 2.未滿3個月之嬰兒不得服用。
  - 3.每日最大建議劑量之含鈉量超過5mEq(0.115g)，增列下述警語：  
本藥每日最大建議劑量之含鈉量超過5mEq(0.115g)，須限鹽飲食之患者不要服用。
  - 4.本品含制酸劑故：
    - ①一天內不可服用超過一日最大劑量，也不可連續服用一日最大劑量兩週以上。
    - ②制酸劑不得併用其他藥品。
- 二、如有慢性胃痛、胃部不適或灼熱感，應先就醫確定診斷後再行服用。
- 三、消化道潰瘍患者應先就醫，不要自行服藥。
- 四、本藥含碳酸氫鈉會引起腹脹、打嗝；如長期與鈣質牛奶併用，會引起高血鈣、腎衰竭、鹼中毒、噁心、嘔吐、頭痛、意識不清、厭食等現象；腎臟病患者使用高劑量會引起鹼中毒；會加重高血壓、心衰竭、腎衰竭、水腫、腹水。有高血壓、心臟病、腎疾、腹水、水腫之患者禁止使用。

## 【包 裝】

3.3 公克~1000 公克塑膠瓶裝。



應元化學製藥股份有限公司

台南市安平工業區新忠路 26 號・TEL:(06)2654883(代表號)