止 痛 鎮 痙 劑

“強生”抑 痛 錠

A. H. P. TABLETS “JOHNSON”

內衛藥製字第 003675 號

【成　　分】每錠含有：

Atropine Sulfate……..…….. 0.0194mg

Hyoscyamine Sulfate……..…….. 0.1037mg

Hyoscine Hydrobromide……..…….... 0.0065mg

Phenobarbital……..…….. … 16.2mg

【賦 形 劑】Hydroxypropyl Cellulose、Lactose、Magnesium Stearate、Povidone、Sodium Starch Glycolate、Starch

【效能及用途】本劑藉微量之顛茄鹼(Belladonna Alkaloids)和苯巴比特魯(Phenobarbital)的協同作用，對於諸臟器之各種過度緊張及痙攣狀態具有止痛鎮痙的效果，而不引起副作用，本劑之成份依其發揮藥性的快慢配合精巧，可使療效平穩而持續，因此服後即見功效，其止痛、鎮痙作用之迅速確實，實為最理想之治療劑。

【適 應 症】胃腸方面：胃酸過多、胃痛、腹痛、賁門痙攣、幽門痙攣、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃炎、腸炎、肛門沉脹。

泌尿生殖器方面：腎石絞痛、月經痛、膀胱沉脹。

其他方面：膽石絞痛、支氣管性氣喘、腦炎後的帕金森氏症狀、車船飛機之眩暈等。

【用法・用量】成人通常每次 1 錠，每日服用 1~3 次，兒童 15~8 歲通常每次 1/4~1/2 錠，每日服用 1~3 次，或可依病況酌量服用(成人每次最多可服用 3 錠)。

本藥須由醫師處方使用。

【不 良 反 應】對於 Barbiturates 類藥品具高度敏感性病人之不良反應主要為過敏反應，包括局部腫脹(localized swelling)、紅斑性皮炎(erythematous dermatitis)。在極少數情形下，使用 phenobarbital 成分藥品的病人可能會發生剝落性皮膚炎(exfoliative dermatitis)的不良反應，如史蒂文生氏－強生症候群(Steven-Johnson syndrome)及毒性表皮壞死溶解症(toxic epidermal necrolysis)等，嚴重可能會導致死亡。

【包　　裝】6~1,000 錠 塑膠瓶裝及鋁箔盒裝。

【儲　　存】本藥應儲存於 25℃以下緊密容器。

JCP

Code No.：B-12

強生化學製藥廠股份有限公司

JOHNSON CHEMICAL PHARMACEUTICAL WORKS CO., LTD.

新北市 241 三重區三和路四段 77、79 號

訂貨專線：(02)29894756 FAX：(02)29712579

工廠電話：(02)22878405