立達補血靈膠囊*

立達補血靈每一膠囊內含下列成份：

維他命 B_{12} 與立達濃縮內在因素
（Vitamin B_{12} with "Autrinic" Intrinsic Factor Concentrate Lederle） $1^1/_2$美國藥局方口服單位（$1^1/_2$ N.F. XI oral units）

延胡索酸亞鐵（Ferrous Fumarate） 350公絲
內含鐵質115公絲

抗壞血酸（維他命 C） 150公絲

葉酸（Folic acid） 2公絲

適應症：

貧血症，缺乏鐵質引起之貧血症，懷孕期之巨初紅血球貧血症。

作用：

立達補血靈適用于治療一般性貧血症，包括因缺乏鐵質引起之貧血症，懷孕期之巨初紅血球貧血症（megaloblastic anemias of pregnancy），及營養不良引起之貧血症。上述病症經已公認適用本品治療，如果治療時對本品發生抗藥性，則對病因宜作進一步研探及進行其他治療法。

立達補血靈能增加口服維他命 B_{12} 之吸收效率。

使用法及劑量：

立達補血靈膠囊，用以治療一般無併發症之貧血症，成人每天一次，每次一粒，飯後或吃飯時服用，治療惡性貧血症之患者應注射維他命B_{12}。本藥須由醫師處方使用。

注意事項：

對本品如有不耐症狀發生則須暫時或永久停藥，長期服用本品須遵照醫囑。

葉酸雖使惡性貧血症患者的普通血液檢查（Peripheral blood picture）之結果變爲正常，實則神經性症狀仍在進行。

對於嚴重之葉酸缺乏而引起口炎性腹瀉（sprue）或吸收不良症狀羣之治療，**立達補血靈**之效果較差，應使用立達出品之葉酸（Folvite）治療。

請置於孩童無法取得之處。

*本商標係由美國氰胺公司授權使用

產品編號	包裝	內衛藥製字第03939號
5155	2～1000粒/瓶(盒)	

Lederle

台灣氰胺股份有限公司

廠址：新竹縣新豐鄉中崙村中崙290-1號

17324202

衛生局收存