內衛藥製字第 04968 號

“新喜” 特克通錠

Decoton Tablets “N.C.P.”

本藥須由醫師處方使用

【藥理作用】

本品(Dexamethasone)為一種 Prednisolone 衍生物，其治療效力較 prednisone 及 prednisolone 強約十倍，僅因其及小劑量及可達到治療目的。

【成分】Each tablet contains：

有效成分及含量：Dexamethasone……0.5mg

賦形劑：Lactose、Starch、Food Color Yellow No.4

【用途(適應症)】

僂麻質斯性關節炎、樓麻質斯熱過敏性疾患，關節炎樣疾患。

【注意事項】

1. 一般的注意：間有誘發感染症，二次性副腎不全，消化性潰瘍，糖尿病、精神障碍害等之嚴重副作用出現，故投與時須注意下列幾點：

(A)使用本劑時須先考慮如有其他適當藥劑，可達預期治療效果時，則不要使用本劑。

(B)使用中須注意小心觀察副作用之出現，並做適當之處置。

(C)連用後，急速中止，偶有發熱、頭痛、食欲不振、脫力感、肌肉痛、關節痛、休克症狀等之離脫症狀出現，故如要中止場合，應漸減劑量，小心使用。

2 禁忌：

(A) 有效抗菌劑不存在之感染症，全身之真菌之患者。

(B) 以前曾對本劑有過敏之患者。

3.下列患者，原則上不要使用，如必要使用之場合須慎重投與：消化性潰瘍、精神病結核性疾患，單純包疹性角膜炎，後更下白內障，高血壓，電解質異常血栓症，最近會進行內臟手術之患者。

4.慎重投與：感染症、馳尿病、骨多孔症、腎不全、甲狀腺機能低下、肝硬變、脂肪肝、脂肪塞栓症、患症筋無力症（初使用時有一時之症狀惡化增加）等之患者。

5.副作用：

小心觀察如有下列症狀出現，應作適當之收置。

(A)感染症：有誘發感染症、感染症惡化等症狀。

(B)內分泌系：二次性副腎不全，糖尿病、月經異常等之症狀出現。

(C)消化器系：消化性潰瘍、腦炎、下痢、惡化、嘔吐、胃痛、胸燒、腹部膨滿感、口渴，食欲亢進等症狀出現。

(D)精神、神經系：間有轖神變調，欣狀感、多幸症、不眠頭痛等症狀。

(E)肌肉、骨骼系：骨多孔症、大腿骨及小腕骨頭無菌性壞死肌莠縮、筋痛，關節痛等之症狀。

(F)脂質蛋白質代謝：偶有月樣顏貌，野牛肩、氮素負平衡等現象出現。

(G)體液、電解質系：偶有浮腫、血壓上昇、低鈣性 alkalosis 等症狀。

(H)眼：偶有後下吏白內障、眼球突出等症狀出現。

(I)血液：偶有白血球增多，血栓症等症狀出規。

(J)皮膚：偶有座瘡、多毛、色素沈著、皮下溢血、紫斑線條、發汗異常、顏面紅斑、創傷治療障碍、皮膚菲落化、脆弱化等症狀出現。

(k)過敏症：如有過敏症出現，應即中止使用。

(L)偶有發熱疲勞感，脂肪肝 steroid 腎症，體重增加，精子數及運動和以前有增減現象。

6. 妊娠授乳婦之投與：

(A)由動物實驗有催奇形之報告，及引起新生兒副腎不全，故孕婦或可能懷孕之婦女，使用須考慮判斷於治療上之有益性及危險上。

(B)本劑有可能於母乳中之移行，故於授乳中避免使用。

7. 幼小兒之投與：

(A)須小心觀察，視小兒之發育抑制現象。

(B)長期投與之混合有腦壓高進之症狀出現。

8. 相互作用：

(A) 和 barbital 酸誘導體 phenytoin 等之併用，會促進代謝，使本劑之作用減弱之報告，故併用場合須注意用量。

(B) 和水楊酸誘導體併用時，可能使血清中之水楊酸誘導體濃度增加，引起水楊酸中毒之報告，故併用場合須注意用量。

(C) 抗凝血劑，如經口服之糖尿病劑之作用減弱之報告故併用場合須注意用量。

(D) 利尿劑（calcium 保持性利尿劑除外）併用有低鈣血症出規，故併用場合須注意用量。

9.其他：副腎皮質 Steroid 劑投與中之患者於疫苗（種痘）接種，有神經障碍，抗體反應欠缺之報告。

10. 本品室溫(避免光保存。

【用法用量】

成人	一般每次服一粒，每日三次，重症或其他症狀時可與其他藥物併用。

【包裝】

1000 粒以下塑膠瓶裝

【儲存條件】：

室溫(15~25℃)儲存。

新喜國際企業股份有限公司
台南市鹽水區孫厝里孫厝寮 4-6 號