

“福元”維他命B6片

VITAMIN B6 Tab “F.Y.”

內衛藥製字第04997號

作用：維他命B6，在生體內皆轉變成具有生理活性的磷酸吡哆醛(Pyridoxal Phosphate)。磷酸吡哆醛在一些必需的代謝反應中被視為一種輔酶，包括脫羧反應，轉胺作用和胺基酸的轉硫作用，tryptophan轉變成serotonin和niacin，和肝醣分解反應。

本劑可①治療pyridoxine缺乏症，如飲食攝取不足，代謝先天性缺陷(如依賴pyridoxine的痙攣，pyridoxine反應性的貧血)或藥物誘發的排空(如由於isoniazid，酒精，口服避孕藥)。②控制懷孕或放射治療所造成的噁心和嘔吐(已經證實對痙攣無效)。③抗皮膚炎維他命。應用於皮膚炎、口內炎、胃腸障礙等。

藥力學：口服吸收良好，轉變成磷酸吡哆醛。半衰期為15～20天。在肝臟代謝成4-pyridoxic acid，再排於尿中。

副作用：(通常為大劑量時)感覺異常，嗜睡，發紅，減低血中葉酸的濃度。

交互作用：①pyridoxine會加速L-DOPA的末梢代謝作用，因而降低L-DOPA的效果。②下列病人對Pyridoxine的需要量必須增加：服用isoniazid，cycloserine，口服避孕藥，hydralazine或penicillamine。③chlora-mpbenicol引起的視神經炎，可用pyridoxine來預防。

醫療提示：1.授乳的母親服用本品宜小心，因為Pyridoxine會干擾泌乳激素，損害乳的分泌。2.要知道有相當酒精中毒的病人顯著的缺乏Pyridoxine，因此，應該補充Pyridoxine，以防止神經性併發症。一般服用isoniazid的病人也常會發生Pyridoxine缺乏症，服用口服避孕藥和某些其他藥物也常發生。

成分：每錠中含

pyridoxine Hydrochloride 10mg.

效能：因缺乏維他命B6引起疾病之預防及治療。

用法用量：成人每次1至2片每日3次由醫師指示使用

注意：遮光，室溫保存。

【包裝】

100錠，500錠，1000錠瓶裝。

LTTO09

福元化學製藥股份有限公司
台北縣瑞芳鎮大寮路95號之1