〝濟生〞10% 葡萄糖 注射液

10% GLUCOSE INJECTION "CHI SHENG"

成　　分　本劑乃純葡萄糖注射液。
Each ml contains:
主成分
Dextrose Monohydrate……0.1 gm
賦形劑
Water for injection
滲透壓比：2

適 應 症　急性傳染病及其他缺乏水份及營養失調，非經口營養補給。

用法用量　通常一日1至數次，每次20mL～100mL注射於靜脈內。

本藥限由醫師使用。

注意事項
㈠禁忌:低張性脫水症患者不得使用。(因投與過剩的水份，恐怕會導致低張性脫水狀態，而使症狀惡化)
㈡具有下列症狀之患者應慎重投與：
⑴缺乏鉀之傾向的患者。(症狀恐怕會惡化)
⑵糖尿病患者。(產生高血糖，而使病情有惡化之慮)
⑶尿崩症之患者。(恐怕會對電解質有影響，並使症狀惡化)
⑷腎臟不健全之患者，(易導致投與過量的水份，而使病情有惡化之慮)
㈢副作用：大量或急速投與，由於會喪失電解質，故須謹慎投與。
㈣對高齡者的投與：由於高齡者的生理機能低下，故投與速度須緩慢，並應小心減量。
㈤使用上的注意：
⑴投與方式：由皮下大量投與時，由於電解質會自血漿中移轉，而導致循環不健全，因此禁止由皮下投與。
⑵投與前：
ⓐ在靜脈內投與時，須顧慮是否會受到感染。
ⓑ本劑為弱酸性，在偏酸性之傾向時，若想與會產生變化的醫藥品相混合，則有事先調查之必要。
ⓒ在寒冷季節時，須溫熱至體溫程度後使用。
ⓓ使用後的殘液不得再用。
⑶投與開始時:投與高濃度或高張液時，應由低濃度的溶液開始投與，再慢慢提高濃度。
⑷投與過程中：由於投與高張液恐會引起血栓靜脈炎之虞，須慎重投與。
⑸投與終了時:投與高濃度溶液時，若急速終止恐會引發低血糖之虞，所以在中止投與時，須慢慢降低葡萄糖濃度。
㈥輸液套選用及插入法：
⑴請依輸液套使用方式正確使用。
⑵請使用附有過濾裝置之輸液套，導入針應以垂直方式插入橡皮塞，插入後請勿扭轉，以免因針割(Coring)產生碎片。
⑶使用前請再檢視，確定無異物後，方可使用。
㈦取用時：
⑴運輸過程中，容器可能因受重擊、震動，而致產生破裂、縫隙或瓶塞鬆動若發現有上述情形時，請勿使用。
⑵若藥液有不澄清、變色、異物或其它異常現象時，請勿使用。

包　　裝　20毫升玻璃安瓿，100支以下盒裝。
100、250、500、1000毫升玻璃瓶裝
250、500、1000毫升塑膠瓶裝
500、1000毫升塑膠袋裝
※本品應避光儲存於25℃以下。

內衛藥製字第005351號

CHI SHENG
濟生醫藥生技股份有限公司
CHI SHENG PHARMA & BIOTECH CO., LTD.
新竹縣湖口鄉勝利村實踐路3號
電話：(03)5983811

3180-04