十全藥品

內衛藥製字第006155號

非麻藥性鎮咳劑

"十全"咳鎮寧錠

Coughzinin Tablets "S.C."

因感冒及其他會引起氣管障礙之病症而言，咳嗽實可謂令人不快而難堪之症狀，為針對其原因而對咳嗽加以改善或抑制起見，一向均以止咳藥作為其對症療法，普通所謂止咳藥者大多以含有可待因Codeine或鴉片生物鹼及其誘導體為主。唯此等生物鹼(又稱有機鹼)均具有幾點共同之性質，如嗜眠因連續使用而引起之習慣性(如上癮、抗藥性)等副作用，頗難得到滿意之結果，本公司有鑑於此製成咳鎮寧錠。

【成份】Each tablet contains：

Becantex..... 25mg
DL-Methylephedrine HCl..... 20mg
Chlorpheniramine maleate..... 2mg
Synthetic aluminum silicate..... 50mg

【特徵】

1. 咳鎮寧在臨床實驗上，其效果較Codeine強1.5倍。
2. 咳鎮寧在臨床實驗上，無習慣性及抗藥性。
3. 咳鎮寧具中和性祛痰作用，故對咳痰及分泌過多者亦能廣收治療之效果。
4. 咳鎮寧配合抗組織胺物質，故對過敏性導致之支氣管性咳嗽亦有療效。
5. 咳鎮寧配合胃腸調合藥品，故對胃潰瘍之患者能安心服用，且能保護之。

【適應症】

支氣管炎所引起之咳嗽。

【用法用量】

通常成人日服三次，每次服1錠，小孩酌減。
醫師藥師藥劑生指示藥。

【注意事項】：

1.一般注意：

①用法、用量正確使用，效果不彰時應中止服用，又應正確指導使用法及觀察。
②連續過度使用時，不整脈甚或引起心跳停止，過度使用應注意之。
③有思睡作用，駕車或操作機械等應特別小心。

2.禁忌：

①緑內障患者。
②前列腺肥大等引起下部尿路閉塞性疾患之患者。

3.慎重投與：

①甲狀腺機能亢進症患者。
②高血壓患者。
③心疾患之患者。
④糖尿病之患者。

4.副作用：

①過敏症：發疹、搔癢感等過敏症狀出現時，應中止服用。
②循環器：心悸亢進、顏面蒼白等症狀。
③精神神經系：神經過敏、焦躁感、複視頭痛、熱感、不快、疲勞、失眠眩暈等。
④泌尿器：多尿、排尿困難等症狀。
⑤消化器：口渴、食慾不振、下痢、噁心、嘔吐、腹部膨滿感等。
⑥血液：若有血小板減少症，無顆粒球症、再生不良性貧血等症狀出現，應小心複察，認為有此症狀應即停服。

5.孕婦之投與：其安全性尚未確立，孕婦或有懷孕可能者在治療上應考慮其利弊，作為給藥之判斷。

6.相互作用：

(a)本劑含有Chlorpheniramine maleate，故與下列藥劑併用或飲酒時會增強作用，應減量或慎重給藥。(中樞神經抑制劑，MAO阻礙劑)。

(b)本劑含有D1-Methylephedrine HCl當其

①與下列藥劑併用會增強作用，應減量或慎重給藥：MAO阻礙劑，甲狀腺製劑(Thyroxine，Liothyronine)等。
②與Epinephrine及Isoprenaline併用，會引起不整脈有可能引起心跳停止，應避免併用。

7.室溫保存。

【賦形劑】：Lactose, Starch, Pregelatinized Starch, Magnesium Stearate, Sodium Starch Glycolate.

【包裝】：1000錠以下塑膠瓶裝。

十全實業股份有限公司
南投市南崗工業區仁和路27號
電　　話：(049)2254221-3
服務專線：(049)2254615
訂購專線：0800-491666
傳　　真：(049)2254617