【仿單】

W 95 mm × H 195 mm

“福元”克胃酸錠
Garsan Tablets “F.Y.”

醫師藥師藥劑生指示藥品　　內衛藥製字第 006309 號

【成　　分】每錠中含有：
Aluminum Hydroxide Hexitol Compound ..... 230.0 mg
Homartropine Methylbromide ……..…… 1.0 mg
賦形劑：
Potato Starch、Sucrose、Mannitol、Sodium Starch Glycolate、Magnesium Stearate、Talc、Menthol Oil、Menthol

【適 應 症】
緩解胃部不適或灼熱感、胃酸過多、消化不良。

【用法用量】
治療消化性潰瘍：每 3 ~ 4 時服用一次，一次 2 ~ 4 錠。
治療胃酸過多：一天 3 次，1 次 1 ~ 2 錠。飯後服用。
12 歲以上，適用成人劑量。6 歲以上未滿 12 歲，適用成人劑量之 1/2。
3 歲以上未滿 6 歲，適用成人劑量之 1/4。3 歲以下，請洽醫師。
單次劑量酸中和和能力>5mEg。

【副 作 用】
含鋁之制酸劑可能引起便秘，偶有噁心、嘔吐。

【注意事項】
1.腎衰竭病患長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症（Dialysis Osteomalacia）、透析性腦病變（Dialysis encephalopathy）及低磷血症，應謹慎小心使用。
2.須置於小孩接觸不到之處。
3.避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
4.除非藥師，藥劑生或醫師指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
5.勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。

【警　　語】
1.除非有藥師、藥劑生或醫師指示，對於牛奶或乳製品過敏者，每日服用藥品中之乳糖含量不得超過 5gm。
2.除非有藥師、藥劑生或醫師指示，一天內不可服用超過每日最大劑量之制酸劑，也不可連續服用每日最大劑量兩週以上。
3.除非有藥師、藥劑生或醫師指示，未滿 3 個月之嬰兒不得服用。
4.內服錠劑應嚼碎後吞服。
5.如有慢性胃痛、胃部不適或灼熱感，應先就醫確定診斷後再行服用制酸劑。
6.消化道潰瘍患者應先就醫，不要自行服藥。
7.除非有藥師、藥劑生或醫師指示，制酸劑不得併用其它藥品。

【儲存條件】請儲存於密閉容器、25°C 以下避光處所，且於期限內使用。

【包　　裝】6 ~ 1000 錠塑膠瓶裝。

LT-T004

福元化學製藥股份有限公司
新北市瑞芳區大寮路 95-1 號