〝利達〞 LMA

命 注射液

Litamin Injection〝LITA〞

【成份】每 ml 含

主成分：Thiamine propyl disulfide------5mg

賦形劑 ：Hydrochloric Acid、Benzyl Alcohol、Sodium sulfite anhydrous Water For Injection

【特徵】

1.具有脂溶性維他命之特性，故對組織之親和力較佳，在生體內儲留之時間亦特長。

2.不但對一般維他命 B1 缺乏症有效，即對所有腳氣樣症狀亦具特效。

3.注射後移行於血球內之維他命 B1 濃度甚高，在體內儲藏器之沉著濃度以及移行體液內之濃度亦均相當高，並且其酯型 B1（Ester type B1）之增加率，亦較以往者為大。

4.經口服用時不被維他命 B1 分解酵素（Aneurinase）所分解，可由腸管悉數吸收，又乳汁內之移行亦甚佳。

5.毒性極低（鹽酸硫胺明之 1/3 至 1/4 程度）。

【適應症】

維他命 B1 缺乏諸症，腳氣樣症狀，多發性神經炎。

【用法用量】

本藥限由醫師使用。

通常用量如下 2~4ml 注射於靜脈內，皮下或肌肉亦可注射，但此時可能有一時性之疼痛產生。

【貯存】

避光貯存於 25℃以下。

【包裝】

2ml × 100Amp 盒裝。

內衛藥製字第 006770 號

利達製藥股份有限公司
台中市大甲區岷山里中山路 1 段 906 號
消費者服務專線 04-26872345

〝利達〞 LMA

命 注射液

Litamin Injection〝LITA〞

【成份】每 ml 含

主成分：Thiamine propyl disulfide------5mg

賦形劑 ：Hydrochloric Acid、Benzyl Alcohol、Sodium sulfite anhydrous Water For Injection

【特徵】

1.具有脂溶性維他命之特性，故對組織之親和力較佳，在生體內儲留之時間亦特長。

2.不但對一般維他命 B1 缺乏症有效，即對所有腳氣樣症狀亦具特效。

3.注射後移行於血球內之維他命 B1 濃度甚高，在體內儲藏器之沉著濃度以及移行體液內之濃度亦均相當高，並且其酯型 B1（Ester type B1）之增加率，亦較以往者為大。

4.經口服用時不被維他命 B1 分解酵素（Aneurinase）所分解，可由腸管悉數吸收，又乳汁內之移行亦甚佳。

5.毒性極低（鹽酸硫胺明之 1/3 至 1/4 程度）。

【適應症】

維他命 B1 缺乏諸症，腳氣樣症狀，多發性神經炎。

【用法用量】

本藥限由醫師使用。

通常用量如下 2~4ml 注射於靜脈內，皮下或肌肉亦可注射，但此時可能有一時性之疼痛產生。

【貯存】

避光貯存於 25℃以下。

【包裝】

2ml × 100Amp 盒裝。

內衛藥製字第 006770 號

利達製藥股份有限公司
台中市大甲區岷山里中山路 1 段 906 號
消費者服務專線 04-26872345