

“利達”

HLA

欲治潰 注射液

Histical Injection “LITA”

【成份】 每 ml 含

主成分：DL—Methionine-----2mg
Histidine Hydrochloride---40mg
Nicotinamide-----1mg
Glycocoll-----2mg

賦形劑：Edetic acid、Sodium formaldehydesulfoxylate、
Water For Injection

【適應症】

胃、十二指腸潰瘍之緩解。

【用法】

本藥限由醫師使用。

1日1~2回每回2ml.皮下或肌肉注射。或1日1回5ml.
靜脈注射。年齡與症狀適宜減量，3~4週持續使用。

【包裝】

靜脈用 5ml × 50Amp 盒裝。

【儲存】

避光儲存於 25°C 以下。

內衛藥製字第 007190 號



利達製藥股份有限公司
台中市大甲區岷山里中山路1段906號
消費者服務專線 04-26872345

利達”

HLA

欲治潰 注射液

Histical Injection “LITA”

【成份】 每 ml 含

主成分：DL—Methionine-----2mg
Histidine Hydrochloride---40mg
Nicotinamide-----1mg
Glycocoll-----2mg

賦形劑：Edetic acid、Sodium formaldehydesulfoxylate、
Water For Injection

【適應症】

胃、十二指腸潰瘍之緩解。

【用法】

本藥限由醫師使用。

1日1~2回每回2ml.皮下或肌肉注射。或1日1回5ml.
靜脈注射。年齡與症狀適宜減量，3~4週持續使用。

【包裝】

靜脈用 5ml × 50Amp 盒裝。

【儲存】

避光儲存於 25°C 以下。

內衛藥製字第 007190 號



利達製藥股份有限公司
台中市大甲區岷山里中山路1段906號
消費者服務專線 04-26872345