劇 "安星" 施可保寧 注射液
Scopomin Injection "Astar"

【性狀】：
本藥為無色無臭味苦之澄明液體。

【成分】：
Each ml contains:
Hyoscine-N-butyl bromide (Scopolamine-N-butyl-bromide).....10mg

【賦 形 劑】：Benzyl Alcohol、Water For Injection。

【作　　用】：
本藥對於副交感神經節之神經傳導，具有遮斷作用，其結果對於胃腸管、膽管、尿路及陰道（腟道）等女性生殖器官，有顯著之鎮痙作用。

【應　　用】：
1.胃腸管之痙攣及運動機能之亢進、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、賁門痙攣、食道痙攣、腸疝痛、痙攣性便秘、幽門痙攣、臍部疝痛、胃割除後之急性排洩、空腸潰瘍、開刀後之噁心、嘔吐、諸類型之呃逆、痙攣性疼痛與炎症性疼痛之診斷鑑別，由於蛔蟲之痙攣，起因於蠕動亢進之腹瀉等症。
2.膽管之痙攣及運動障礙—膽囊炎、膽管炎、膽石症、膽石疝痛、膽囊割除後之症候群。
3.尿道之疾患—膀胱痛，儀器插後之尿管及膀胱痙攣。
4.女性生殖器之痙攣狀態—分娩時子宮下部弛緩遲延，初期流產及不全流產之輔助治療性月經困難，子宮內惡露停滯。

【適 應 症】：
胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃炎、胃賁門痙攣、食道痙攣、膽囊炎、膽管炎、膀胱痛。

【用法、用量】：
成人一次10~20mg(1-2ml)，注射於皮下或肌肉，或混合葡萄糖液徐徐(5-10分鐘之久)注射於靜脈。本藥限由醫師使用。

【包　　裝】：
2毫升安瓿裝，100支以下盒裝。

【注意事項】：
1. 本藥須貯存於冷暗處。
2.使用本藥後偶有頭暈，瞳孔散大等輕微副作用。

安星製藥股份有限公司
新竹縣新豐鄉鳳坑村坑子口673 號