尼斯排癆® 錠

NYSPADO® Tablets


內衛藥製字第 07840 號

結核化學療劑

尼斯排癆(Nyspado)，優點如下：

- 療效大迅速－服後結核症狀消失急速，食慾體重顯著增加。
- 抗菌力優越持久－不論新舊輕重病患或有無抗藥性者，均有優異持久之療效。
- 使用方便－免注射之疼痛，絕無頭暈，耳鳴之不良副作用。
- 耐受性良好無毒性－任何病人均可耐受，絕不損胃腸，肝臟或生噁心、嘔吐、腹瀉、皮疹之現象。

「成分 • 特點」：Each tablet contains：



Isonicotinic Acid Hydrazide p-aminosalicylate 100mg

尼斯排癆(Nyspado)口服片劑 每片含 100mg 之 Nicotinic acid hydrazidepaminosalicylate 主要成份，其化學構造式如左。

「適應症」：

結核病

「用法 • 用量」：

服用劑量依各人身體情況而異，標準服用如下：

成人：每日 4-6 片(每十公斤體重一片)，分三次飯後服用。

兒童：每日 2-4 片(每十公斤體重二片)，分三次飯後服用。

治療期間應視每患者情況而異，大抵需要六個月至一年的時間。痊癒後再繼續服用一個月以求徹底痊癒。

(本藥須由醫師處方使用)。

「注意事項」：

INH：

1.病人若有任何肝炎症狀或前兆，如疲勞、虛弱、不適、厭食、噁心、嘔吐應立刻告知醫生並作肝臟適當之檢查。

2.若有過敏反應產生，應停藥。若要再使用，需待所有症狀消失後，並應由低劑量開始，慢慢增加至合適之劑量。若再產生肝臟之症狀，則應立刻停藥。

3.病人併用 phenytoin 時，因 INH 可能減低 phenytoin 之排泄，使其作用增加，故應再調整 phenytoin 之抗癲癇作用至最適當劑量

4.每日酒精之吸收可增加肝炎產生之機會。

5.於開始服藥前及定期應作眼科檢查，包括檢眼鏡檢查。

6.於動物實驗時顯示 INH 藥物會影響胚胎，雖沒 INH 與先天異常發生之關係報告，但應衡量其對胎兒之影響。

7.INH 可穿透胎盤及分泌於母乳，應注意其副作用。

8.於同系之小白鼠實驗時，發現 INH 誘發產生肺腫瘤。

PAS：

1.可能加重結腸炎之症狀，其急性反應特徵為：痙攣、腹痛、血痢，有時可能有發燒、頭痛、不適、搔癢病、紅斑、結合膜炎等，一般停藥後症狀可減輕。

2.有些病人可能產生過敏反應。

3.可能導致腎損傷、急性或慢性間質性腎炎、腎功能失調。於動物實驗時，產生腎乳頭狀壞死。

4.動物實驗時，未發現有癌症及損害生育力

之反應。

5.動物實驗時，未發現對胎兒有畸胎之影響，但對人類未能証明其影響，故懷孕時，除非必要，否則應避免。

6.有低濃度之 PAS 及高濃度之 N-acetyl 代謝物分泌於母乳中，故餵乳時，應小心其影響。

7.對兒童之安全性及影響未知。

「包裝」：

100 片、1000 片裝。