內衛藥製字第 008234 號

# 雅黴素乾糖漿
# Erymycin Dry Syrup

綱號：A21

Erythromycin Estolate 是最近發現最活性型之口服 Erythromycin，因其在酸中非常安定，容易吸收，不易在膽汁內被排泄，故如與 Erythromycin 投與相等劑量時，Erythromycin Estolate 比 Erythromycin 較迅速地被吸收，因此可得較高之血中濃度及較長之持續時間。本劑即採用 Erythromycin Estolate 為主成分所製成之滴劑，美味芳香，特別適合幼小兒之服用而達到治療之效果。

**成分：**每 0.5gm 含有：Erythromycin Estolate eq to Erythromycin Base……100mg

**適應症：**對葡萄球菌，鏈球菌，肺炎雙球菌，Klebs 氏菌屬，Shigella 氏菌屬，白喉棒菌桿菌，痢疾變形蟲等感染症。

**作用：**

1.臉緣炎、結合膜炎、骨眶蜂窩織炎、眼球筋膜炎、沙眼。
2.耳炎、乳突炎、竇炎、咽炎、濾胞性扁桃體炎、扁桃體周圍膿腫、喉炎、氣管炎、白喉病及併發症。
3.齒齦炎、口炎、Vincent 氏咽峽炎。
4.氣管支氣管炎，支氣管炎、支氣管肺炎、支氣管擴張、大葉肺炎、非定型性肺炎(併發症)、膿胸、鸚鵡病。
5.急慢性細菌性心內膜炎、膿毒性心包炎、風濕熱之預防。
6.腸胃炎、腸炎、結腸炎、小腸結腸炎、食物中毒、由於抗生素使用後引起葡萄球菌屬之腸炎、膽囊炎、膽管炎、肝膿腫、腹膜炎、阿米巴病、阿米巴膿腫。
7.龜頭炎、尿道炎、附睪炎、前列腺炎、膀胱炎、結石性腎盂炎、血管球性腎炎之腎盂腎炎、淋病、腹股溝肉芽腫、花柳性淋巴肉芽腫、梅毒。
8.髓膜炎。
9.傳染性關節炎、淋菌性關節炎、癤病、骨髓炎、毛囊炎、尋常鬚瘡、膿皰病、粉刺、褥瘡。
10.菌血症、膿毒病、產後膿毒病、布氏桿菌病、丹毒。
11.麻疹(併發症)、猩紅熱。

**用法：**本藥須由醫師處方使用。

對 5gm、7.5gm、15gm 裝各加入冷開水 7ml、10.5ml、21ml 即可得 10ml、15ml、30ml 糖漿，每 ml 含有 Erythromycin Base 100mg。

體重在 11kg 以下之嬰孩及兒童每六小時服用一次。劑量按體重計算，一次每公斤服用 11mg。體重從 11kg 至 22kg 兒童每六小時服用 125mg。如為重症或深部感染時可加倍投與。

本製品所附之量杯，平滿時約 18gm。

**注意：**

**1.本劑調成糖漿後，置於室溫之下，須於兩星期內服用。**
**2.抗生素之使用偶而會導致非感受性微生物之過度生長，所以需要時常觀察病人。假如有特異反應發生，應立即停止投藥。**

**包裝：**5，7.5，15，30，50，100，250，500gm 裝

**賦形劑：**Silicon dioxide (Aerosil 200 UC)，Lactose monohydrate，Sucrose，Corn starch，Purified water，Carmellose sodium，Sodium saccharin，Sodium benzoate，Ethyl maltol，Color Erythrosine No.3，Color Yellow No.6 (Al-lake)，Orange flavor powder

中國化學製藥股份有限公司
CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.
總公司：台北市襄陽路 23 號 TEL：(02)23124200
新豐工廠：新竹縣新豐鄉坑子口 182-1 號
©