

內衛藥製字第008661號

“仙台”

氧化鋅軟膏

Unguentum Zinci Oxidi “Sentai”

【成 分】

有效成分及含量：

Each gm contains : Zinc Oxide..... 200mg

【其他成分(賦形劑)】：

Xanthan Gum、Tween 60、Propylene Glycol、Methyl Paraben、Stearic acid、Cetyl Alcohol、Silicon oil、Mineral oil、Castor Oil、Propyl Paraben、Span 60、Purified Water

【用途(適應症)】：緩解尿布疹。

【使用上注意事項】：

- 有下列情形者，請勿使用：

1.曾因本藥成分引起過敏的人。

- 有下列情形者，請洽醫師診治：

1.深部皮膚組織感染。

- 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

1.兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

- 其他使用上注意事項：

1.為防止兒童誤食請妥善保管。

2.兒童需於監護者的指導與監督下使用。

3.避免陽光直射。

4.勿超過建議使用量或使用次數。

5.使用部位或其周圍髒污時，請洗乾淨後再用藥。

6.使用本藥前後應徹底洗淨雙手。

7.本藥限於皮膚外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得用於眼睛四周或黏膜
(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)。

8.請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立即以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。

9.本藥勿使用於大面積之體表(以超過使用者的兩手掌面積為參考)。

10.使用後請保持塗抹部為透氣，勿密封，以免增加副作用。

11.患部有下列狀況者，建議不要使用

- 有傷口或紅腫。

- 傷口流膿或潰爛。

【用法用量】：

使用部位	天/次數
適量塗於患部	每日1~4次

【警 語】：

一、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

部位	副作用
皮膚	發疹、發紅、發癢、刺激感、脫皮

二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

(一) 若有上述外之其他不適情況產生。

(二) 連續使用7天後狀況未改善或更惡化。

【包 裝】：1000公克以下鋁管裝、塑膠瓶裝。

【貯 存】：25°C以下密閉貯存。

