●合成副腎皮質荷爾蒙製劑●

"大豐" **力及美壯** 注射液 4毫克/毫升

Dexamesone Inj. 4mg/ml "T.F."

[成分]：本劑1ml.中含有
Dexamethasone Sodium Phosphate.....4.0mg
[賦形劑]
Methyl Hydroxybenzoate, Propyl P-hydroxybenzoate, Sodium Citrate, Edetate Disodium, Sodium Bisulfite, Water for injection.
[效能]：
(1)本劑對風濕抗炎症效能約強於Prednisolone之6.5倍。較Hydrocortison強30倍。
(2)普通用量不會引起Na水份的貯留，K排泄所發生浮腫，體重增加，心臟衰弱等副作用，能繼續治療。
(3)凡是副腎荷爾蒙製劑之治療量不能達到滿足的效能或因副作用不能繼續治療之疾患，本劑能發揮優秀效果。
[適應症]：
風濕性關節炎、皮膚炎、紅斑性狼瘡、支氣管氣喘、過敏性疾患。
[用法用量]：
(1)視其疾患之種類及程度，並配合其他療法後決定其用量。
(2)肌肉注射、靜脈注射：1次量2~10mg。
(3)關節腔內：膝關節1回量4~6mg，指骨關節1回量0.8~1mg。
(4)軟組織內：1回量2~6mg。
(5)點眼：通常將本注射液用生理食鹽水稀釋20倍。
[警語及注意事項]：
1.本藥限由醫師使用。
2.急慢性感染症使用時請同時併用適當的化學療法劑或抗生素藥品以治療感染疾病。
3.對消化管障礙如胃腸潰瘍務特別注意。
4.因主要副作用引起浮腫、血壓上昇，尤以腎臟疾患及高血壓患者應注意。
5.糖尿病患者使用時有增加INSULIN藥量的必要請注意。
6.對於有精神因素者多加注意。
7.使用本劑期間請充分補充蛋白質。
8.本產品含有防腐劑成分，不應以椎管內（intracanal）或硬脊膜外(epidural)注射給藥。
9.曾有文獻報導於硬脊膜外注射(epidural administration)給予皮質類固醇後發生罕見但嚴重的神經系統不良反應，包括視力喪失、中風、癱瘓、死亡等，多數個案發生於懸浮或緩釋劑型之皮質類固醇類注射劑成分藥品。
[包裝]：1毫升10、50、100、200等安瓿裝，10毫升100支以下小瓶裝
內衛藥製字第008800號

GMP藥廠

大豐製藥股份有限公司
公司・工廠：彰化市延平里岸頭巷11號

檔號：105.C23誠-03D

PDF 檔案使用 "pdfFactory Pro" 試用版本建立 www.pdffactory.com