新抗過敏性劑

敏 通 散

Chloramine Powder

內衛藥製字第 09037 號

自從過敏性疾病係由於組織胺或類似組織胺物質所引起之說確定後，醫藥學家們潛心於抗組織胺藥物的研究，且以其直接用爲過敏症之治療；但所採用之抗組織胺劑均因服用後常有昏睡，眩暈，噁心，嘔吐等副作用，或者藥效低治療量需極大，漸被淘汰。因此抗組織胺劑之研究始終不懈，至今陸續產生者已有多種，經多方面臨床實驗比較之結果，發現最新合成之 Chlorpheniramine Maleate 最爲理想，因其效力最強而副作用殆無，遂被廣泛使用。

根據 Bain 等博士實驗結果，對於一定量組織胺的抑制作用量如下列之表，可以最少用量而能發揮最大之作用由此表便可知。

抗 組 織 胺 劑	抑制作用量
Chlorpheniramine Maleate	8mg
Promethazine	16mg
Chlorocyclizine	38mg
Pyrilamine	105mg
Antazoline	230mg
Thonzylamine	330mg

它能減少氣管之分泌物抑制胃酸分泌，緩和胃潰瘍之痛覺，所以服用它絕無傷胃之弊，又它具有使血管收縮的作用，在抗組織胺劑中副作用最少，如下表所示便可明瞭。

抗 組 織 胺 劑	副作用發現率（%）
Chlorpheniramine Maleate	3-7.5
Thonzylamine	9-16
Pheniramine	12-24
Antazoline	14-23
Tripelennamine	19-35
Diphenhydramine	43-61

成　　份：每Gm內含 Chlorpheniramine Maleate　10mg

特　　點：1. 效力發揮快而强。
2. 無昏睡倦怠等副作用，安全性最大，可安心服用。
3. 服用極爲簡便。

適 應 症：麻疹、枯草熱、濕疹、風疹、氣喘、過敏性鼻炎、過敏性症狀。

用法用量：成人每日 1～3 次，每次 0.2～0.4 Gm。調劑專用

包　　裝：1 Gm，膠紙裝 10Gm，50 Gm，100Gm，1000 Gm 玻璃瓶裝。　500 Gm紙盒。

居禮化學藥廠有限公司
台北縣淡水鎮忠山里中洲子 3 之 1 號