

"國信" 斯可寧 注射液

Sconin Inj "K.S."

內衛藥製字第 09201 號

「成份」：每 c.c. 含：

Hyoscine-N-butylbromide 20mg

賦型劑：Water for Injection

「適應症」：

急性痙攣症、腸胃道、膽道、尿道之痙攣症。

「用法用量」：

每次 1 支每日數次。本藥限由醫師使用。

「注意事項」：

1. 一般的注意－眼調節障害，投與中之患者避免操作機械及駕車。

2. 禁忌－①線內障患者。

②麻痺性腸阻塞(ileus)患者。

③前列腺肥大所致之排尿困難之患者。

④重篤性心疾患者。

⑤對本劑有過敏之既往歷者。

3. 慎重投與－A 前列腺肥大患者。

B 血性心不全患者。

C 不整脈患者。

D 潰瘍性大腸炎患者。

E 甲狀腺機能亢進患者。

F 高溫環境患者。

4. 相互作用－與下列各劑併用，有增強本劑作用：

三環系亢憂鬱劑、phenothiazine 系

藥劑、MAO 抑制劑、抗組織胺劑。

5. 副作用－①休克－有嘔心、嘔吐、惡寒、皮膚蒼白、血壓低下現象、中止使用。

②消化器－口渴、嘔心、嘔吐。

③眼：眼調節障害。

④泌尿器－排尿困難。

⑤精神神經系－頭痛、頭重感、眠氣。

⑥循環器－心悸亢進。

⑦過敏症－發疹。

⑧其他－顏面潮紅。

6. 高齡者投與－一般高齡者伴隨有前列腺肥大患者要慎重投與。

7. 妊婦投與－妊娠中之婦女投與，其安全性尚未確立，對妊婦及可能懷孕之婦女，在治療上之有益性與危險性間作慎重考慮。

「包裝」：

1c.c. 10A 100A

委託者：國信藥品股份有限公司

嘉義市南興路 222 號

製造廠：壽元化學工業股份有限公司

嘉義市新民路 128 號