

溫和寧神劑 您勿怒片

Rinul Tablets 內衛藥製字第 09576 號

本用主成份 Chlordiazepoxide 為瑞士 Roche 研究所創製與向來沿用之神經安定劑構造及作用不同，經四萬病例之臨床實驗證明本劑對不安，緊張、焦燥感、抑鬱、痙攣，有特異之功效，即對廣範圍之精神障害兼有 Meprobamate，Chlorpromazine 或其他鎮靜藥之諸優點，而且本劑毒性極低，有增進食慾之現象。

本劑與向來沿用之鎮靜藥比較有下列諸特長：

1. 對不安、緊張、焦燥感之解除遠較 Meprobamate 為優，且無如 Chlorpromazine，Reserpine 等之自律神經遮斷作用。

2. 對各種痙攣之緩解或防止比

Meprobamate，Chlorpromazine，Phenobarbital 強。

3. 脊椎反射抑制作用為 Meprobamate 之 10 倍強。

4. 對循環系統作用殆無。

5. 毒性極低反而有食慾增進之效用。

本品臨床治療範圍廣泛，凡不安、緊張均適用，少劑量時對中度癲癇，緊張狀態，頭痛，失眠，手術前後之不安，興奮狀態，由精神神經等引起之肌內痙攣，對小兒之不安，緊張等異常行動之緩解，隻中能力之增加，小腦發生之痙攣狀態等有效。

「成分」：每糖衣錠含有：

Chlordiazepoxide HCl

10mg.

「適應症」：

焦慮狀態，急性酒精戒斷症候群。

「用法用量」：

成人每日 2-3 次，每次 1~2 片，，孩童每次 1 片以下，本藥須由醫師處方使用。

「包裝」：

10`s，膠紙裝 30`s，50`s，100`s，500`s，1000`s 玻璃瓶裝。

「副作用」：

本劑毒性極低，副作用之發生極少，但偶而有下列輕微副作用。

1. 某些病例，特別是老人與虛弱者偶而會有輕微之昏懂和由肌強直引起之運動失調，但可調節劑量而消滅之。

2. 有些雖在開始使用小劑量時亦有倦睡現象，但往往幾天後即行消失，或少劑量即可完全消失。

3. 在很少數病例會有發疹，噁心及便秘或增減性慾現象。

「注意事項」：

1. 服用本劑時請勿飲酒。

2. 老年人如患有嚴重之心臟病如需服用本劑，應請醫師特別指示。



信東化學工業股份有限公司居禮廠

台北縣淡水鎮忠山里中洲子 3 之 1 號