

止瀉劑  
腸可清懸液  
Kaomix Suspension

內衛藥製字第 09579 號

「成份」：每 ml 內含：

Kaolin..... 200mg

Pectin..... 10mg

「作用」：

Pectin 與 Kaolin 同為腸內有效吸著劑為良好之止瀉劑。

由以上二種藥劑之聯合作用，同時吸去有害之細菌毒素及其他刺激物，以阻止腸之過度蠕動恢復腸機能，並促進糞便之正常形成而排出。

「適應症」：

緩解輕微或中度急性腹瀉。

「用法用量」：

一天 3 次，或需要時服用。服用間隔應在 4 小時以上。成人每次 9ml，12 歲以上適用成人劑量。

醫師藥師藥劑生指示藥品。

「注意事項」：

- 一、 為防止兒童誤食請妥善保管。
- 二、 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
- 三、 除非醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
- 四、 勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。
- 五、 使用前須振搖均勻，並使用廠商所附量器量取藥量。

「警語」：

(一)、除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：

1. 本藥每日最大量建議量之乳糖含量超過 5g，對於牛奶或乳製品耐受度低者應小心服用或請諮詢醫師藥師藥劑生。
2. 急性腹瀉不得使用超過 48 小時。
3. 6 歲以下小孩、或有發燒及全身症狀者、最近使用過抗生素者、有潰瘍性結腸炎或類似患者不得自行使用。
4. 本藥含收斂成分，不得自行使用於帶有嘔氣、腹痛、腹部膨脹等症狀之急性下痢。

(二)、本藥含止瀉成分可能引起便秘。

(三)、除非有醫師藥師藥劑生指示，12 歲以下小孩、或有發燒及全身症狀者、最近使用過抗生素者、有潰瘍性結腸炎或類似患者不得自行使用。

(四)、血便或黑便的病患請勿使用。

(五)、便中帶有黏稠液體的病患請詢問醫師後使用。

(六)、服用其他藥物的病患，請詢問醫師或藥師後使用，本藥物與其他藥物至少間隔三小時服用。

(七)、若有病情加重或腹瀉超過兩天以上的現象發生，請立刻停用並詢問醫師。

(八)、腹瀉最重要的治療是水份與電解質的補充，止瀉劑只能做為輔助性治療。

(九)、不嚴重的腹瀉，不吃藥也可能自行痊癒。

「貯存方式」

室溫(15~30°C)貯存。

「包裝」：

54~4,000 毫升玻璃瓶裝、塑膠瓶裝。



居禮化學藥品股份有限公司淡水廠

新北市淡水區忠山里中洲子 3 之 1 號