

“安星”蛋白新注射液

PROTOSIN INJECTION

【特徵】

本劑由19. Nor-androstenolone Phenylpropionate製成。它雖然與男性荷爾蒙有(Testerone Phenyl Propionate)相近，但其最大區別是：它能甚少男性性徵作用，而具強力之同化作用(Anabolic effect)。因此，能節省蛋白質，而刺激組織細胞之構成。

【成分】

本劑每cc.中有如下成分：

19-Nor-androstenolone Phenylpropionate.....25mg
及Chlorobutanol、Benzyl Alcohol、Salad Oil。

【適應症】

骨骼疏鬆症(Osteoporosis)、男性性腺機能不足症(Hypogonadism)、手術後、外傷、熱傷、慢性腎臟疾病引起之體質極度消耗，再生不良性貧血引起之骨髓消耗狀態。

【注意】

- (1) 使用前醫師應切實權衡其利弊，如另有代替使用之藥品，避免使用。
- (2) 本藥宜避免大劑量或長期服用。
- (3) 孕婦長期服用該藥可能導致女性胎兒男性化，故已懷孕或可能懷孕之婦女避免使用。
- (4) 對於小兒會引起骨骼之早期閉鎖(Premature closure of the epiphyses)及性早熟等現象，故應十分慎重觀察投與，十二歲以下小孩避免使用。
- (5) 對於前列腺肥大、心臟、腎臟疾病患者、癌的骨轉移患者及高齡者(鈉或體液滯留、高鈣血症者)、糖尿病患者，應慎重投藥，肝機能障礙者禁用本劑。
- (6) 服用本劑會有黃疸現象，將導致GOT GPT之上昇，長期投藥應做定期肝功能檢查，若發現有異常者，即停止給藥。
- (7) 如有下列症狀出現時，應立即中止投藥①女性：聲音低沉、多毛、色素沈著、月經異常、陰核肥大、性慾亢進②男性：痤瘡、陰莖肥大、陽萎、持續性勃起，甚至精子減少、精液減少等睪丸機能抑制現象。
- (8) 有過敏現象時應立即中止給藥。
- (9) 服用本藥會導致噁心、嘔吐、食慾不振、便秘、下痢等胃腸障礙以及頭痛、頭暈、興奮、不眠之精神神經系統障礙。

【用量】

成人每週一次，每次25mg，兒童每週一次，每次10mg，注射於肌肉，或視需要增加劑量。

本藥限由醫師使用。

【包裝】

1、2公撮/小瓶，2公撮/玻璃安瓿，100支以下盒裝。

【儲存】

室溫避光儲存。

安星製藥股份有限公司
新竹縣新豐鄉鳳坑村坑子口673號

①