

“東洲” 哲 娜 眠 糖漿

Neo-Benamin Syrup

【組成】：

糖漿劑：每毫升中含有

Chlorphehiramin Maleate 0.5mg

(賦形劑) : Sucrose, Fast green FCF, Orange(Flavor), Purified water.

【適應症】：緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀（流鼻水、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢）及過敏所引起之搔癢、皮膚癢疹。

【用法用量】

一日3至4次，每次間隔4小時以上服用，成人每次8ml。

12歲以上適用成人劑量：

6歲以上未滿12歲，每次4ml；

3歲以上未滿6歲，每次2ml；

3歲以下之嬰幼兒，請洽醫師診治，不宜自行使用。

【醫師藥師藥劑生指示藥品】

【注意事項】

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。

2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。

3. 除非有醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。

4. 勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。

5. 使用前須振搖均勻，並使用廠商所附量器量取藥量。

警語：

1. 服用本藥後，可能引起倦怠感、口乾，偶有視覺上之困擾，偶見興奮反應（以幼兒及老年人較常見）。

2. 除非醫師處方，嚴重之代謝性肝腎疾病患者不得服用。

3. 除非有醫師藥師藥劑生指示，曾經因本類藥物引起過敏症狀者不得服用。

4. 除非有醫師藥師藥劑生指示，曾經有心機能障礙、高血壓、糖尿病、甲狀腺機能亢進、腎機能障礙症狀者不得服用。

5. 老年人應小心使用本藥，3歲以下不建議服用。

6. 如有呼吸之毛病或慢性支氣管炎、青光眼、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難或因前列腺腫大引起之排尿困難患者，請勿服用。

7. 服用本藥不得與酒精性飲料合用。

8. 除非有醫師藥師藥劑生指示，不得併用鎮靜劑或安眠劑等。

9. 服用本藥後，可能引起嗜睡現象，勿駕車或操作危險器械。

10. 連續服用本藥數日後，如果症狀沒有改善，應停藥立即就醫。

11. 不得與其他含有抗組織胺成分或鼻充血解除成分之內服製劑共用（如綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鎮暈藥、鼻炎藥物或抗過敏藥等）。

【儲藏】：室溫保存，放置於日光照射不到處所。

【包裝】：48~4000毫升 HDPE塑膠瓶裝。



東洲化學製藥廠股份有限公司

台北縣蘆洲市中山二路195巷12號

電話：22818383 · 22838383 · 22858383

傳真：22857467