“人人”鹽酸四環素肌肉注射劑

TETRACYCLINE INTRAMUSCULAR “GCPC”

內衛藥製字第 011125 號

本品爲廣效抗生素，對多種革蘭氏陽性菌及陰性菌之感染具有療效，無論口服或注射，對人體各部組織具療效。對於不能口服之患使用本劑注射，即可使患者得抗菌作用均勻之血中濃度，達成治療目的。

成分：

每 vial 含 Tetracycine Hydrochloride……100mg

Procaine hydrochloride……40mg

賦形劑：Magnesium chloride、Ascorbic acid

適應症：

支氣管炎、扁桃腺炎、肺炎、急性心內膜炎、膽道炎、急性胃腸炎、腎盂炎、淋菌性尿道炎、子宮炎、乳房炎、產褥熱、腹膜炎、中耳炎、眼部感染症、癤病、敗血症、蜂窩組織炎。

用法用量：

本劑注射療法宜於患者不能使用口服劑之情況下使用之，注射時應直接注入深部肌肉，適宜注射於臀部之肌肉內，如誤注射入板卜或脂肪層內時，可能於局部有微痛或硬結，可用冰袋敷於局部緩和減除之。

成人平均劑量每日 200 至 300 毫克，每 8 至 12 小時施行深肌肉注射一次，每次注射 100 毫克。如對嚴重性之感染或注射後未達預期效果時，則宜酌情增加劑量，以期可以獲得最大之效果。

嬰兒及小兒劑量宜依據其年齡、體重及其症狀之嚴重情形而定，每日劑量，普通按體重比例計算，每公斤體重每日劑量爲 10 毫克，分 2 至 3 次注射即能產生足夠有效之血中濃度。

如患者能口服時，宜儘量改用口服膠囊劑或糖漿劑以代替肌肉注射治療。於患者之炎症消失或體溫恢復正常，仍宜繼續投予口服劑 1 至 2 日。

對於淋病白濁，其最低劑量應爲 200 至 250 毫克，連續二日使用。

本藥限由醫師使用。

注射液調配法：

本品使用加入注射用蒸餾水或生理食鹽水 2 毫升，搖盪之，使鹽酸四環素完全溶解，即可供肌肉深部注射用。調配成注射液後宜放置於一般室內溫度處，如放置已逾 24 小時後請勿使用。

注意事項：

1. 本抗生素用作口服或注射時可能導致嚴重之肝臟或腎臟變壞，大量注射時常能導致死亡，尤以作爲孕婦及具肝、腎疾病患者之感染治療時爲然，故在使用本劑前及使用期間內應作肝腎機能及血尿素氮之檢查（Blood Urea Nitrogen determination）在發現對肝腎有副作用發生時，當即停止使用或予適當治療，則常可恢復正常。
2. 如患者腎臟機能有障礙時，僅以口服或非口服常用劑量，即可導致物體內蓄積量超過及可能發生肝臟中毒，在此狀況下，應使用比正常量爲少之劑量，如治療須延長時，應注

意測定血清中四環素濃度。

3. 發現有過敏現象時應立即停止使用。
4. 治療期間同時觀察有否促成抗生素通有之無感受細菌之生長（尤以白色念珠菌之感染），如發現則酌量服用或借他法防止之。
5. 鹽酸四環素係低毒性之抗生素，有些患者於注射此種溶液後，局部微感疼痛，故注射時必須注入深肌內，以免發生微痛及硬結。
6. 有些患者對鹽普魯卡因有過敏現象，因本品內含有鹽酸普魯卡因，故已知對鹽酸普魯卡因有過敏性反應者，請勿使用。

儲存：

請貯存於室溫。

包裝：

1 小瓶裝。

委託者：cGMP 人人化學製藥股份有限公司
中壢市南園二路 3 號

製造廠：東洲化學製藥廠股份有限公司
新北市蘆洲區中山二路 195 巷 12 號