


“安星”
立 爽 朗 21.p 注射液
Dexamethasone-21.P Injection “Astar”

【性狀成份】

本劑為無色澄明注射液每c. c. 中含

Dexamethasone-21-Phosphate Sodium..... 1mg

其化學構造式如下



【賦形劑】

Citric Acid、Sodium Hydroxide、Disodium Edetate、Propylene Glycol、Benzyl Alcohol、Water For Injection。

【作用及特點】

- 1.本劑係強力人工合成副腎皮質荷爾蒙故少劑量之施用能得到最大之效果。
- 2.水溶性速效性肌肉或靜脈注射後15~30分即見效。
- 3.本劑對使用其他副腎皮質荷爾蒙已不奏效之時仍能顯出確實之效果。
- 4.較不會引起鈉鹽水份之貯留及鉀鹽之過排泄。

【適應症】

傷麻質斯性關節炎、過敏性疾患(支氣管氣喘性)結合織炎，關節炎樣疾患(滑液囊炎、腱炎、關節周圍炎)重症皮膚疾患(濕疹、皮膚炎、乾癬、天疱瘡)肉芽腫、火傷手術時之休克。

【用法用量】

- 1.視疾患種類及程度患者個人差而定。
- 2.通常成人一日初次1.5~2c.c. (1.5~2mg)以後維持量一日0.5~1.5c.c.(0.5~1.5mg)皮下肌肉或關節腔內注射。
- 3.限由醫師使用。

【注意事項】

- 1.急慢性感染症使用時請同時併用適當的化學療法劑或抗生素藥品以治療感染疾患。
- 2.對消化管障害和胃腸潰瘍務特別注意。
- 3.因主要副作用引起浮腫血壓上昇是以腎臟疾患及高血壓患者應注意。
- 4.糖尿病患者使用時有增加Insulin藥量的必要請注意。
- 5.對於有神精痛因素者多加注意。
- 6.服用本劑期間請充份補充蛋白質。

【絕對禁忌】

精神病、消化管潰瘍、抗生物質不能奏效之須要手術之感染性疾患。

比較的禁忌：

心臟血管障害，腎機能不全、糖尿病、閉塞性靜脈炎、骨粗鬆病、痙攣性疾患結核。

【警語及注意事項】

- 1.曾有文獻報導於硬脊膜外注射(epidural administration)給予皮質類固醇後發生罕見但嚴重的神經系統不良反應，包括視力喪失、中風、癱瘓、死亡等，多數個案發生於懸浮或緩釋劑型之皮質類固醇類注射劑成分藥品。
- 2.本產品含有防腐劑成分、不應以椎管內(intracanal)或硬脊膜外(epidural)注射給藥。

【包裝】

- 1ml X 100A以下盒裝。
- 2ml X 100A以下盒裝。
- 10ml X 100V以下盒裝。

安星製藥股份有限公司
 新竹縣新豐鄉鳳坑村坑子口673號