瑩光眼藥水

Shine Eye Drop

維護我們「靈魂之窗」的健康！

我們的生活正邁向高度化文明的進展中，更促使我們的眼睛經常會受到繁雜生活中種種刺激的可能，也更容易導致眼睛的疲勞，甚至於形成容易引起眼病的狀態，因此保護眼睛為維持健康不容忽視的問題。電視愛好者、用功的學生、夜勤、宵夜以及都市空氣的污濁等等，都極易引起眼睛的疲勞，本眼液配有成分 Vitamin A 以及 Sodium Chondroitin Sulfate 等多種成分，對眼睛疲勞之緩解具有效果。

【成分】

有效成分及含量：每 ml 中含有：

Vitamin A palmitate……500I.U.
Zinc Sulfate……0.5mg
d-Panthenol……1mg
Chlorpheniramine Maleate……0.2mg
Sodium Chondroitin Sulfate……1mg

其他成分(賦形劑)：Tween 80、Propylene Glycol、Boric Acid、L-Menthol、Borneol、Chlorobutanol、Thiamerosal、Sodium Bisulfite、Sodium Borate、Polyvinylpyrrolidone、Distilled Water。

【作用與特長】

本藥配有收斂劑 Zinc Sulfate 具有緩和眼球充血發紅之現象。

【用途(適應症)】

暫時緩解因輕微眼部刺激所引起之不適、眼睛癢、眼睛疲勞。

【使用上注意事項】

一、 有下列情形者，請勿使用：

(一) 曾因本藥成分引起過敏的人。

(二) 使用數週後產生接觸性眼瞼或角結膜炎。

二、 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

(一)正在接受醫師治療或醫師處方眼藥的人。

三、 其他使用上注意事項

(一) 為防止兒童誤食請妥善保管。

(二) 避免陽光直射。

(三) 使用前，請洗淨雙手。

(四) 請依照藥品標示使用。

(五) 以下情形，請勿繼續使用。

1. **超過保存期限的眼藥水。**
2. **開瓶 28 天後。**
3. **藥液混濁、變色或出現異物時。**

(六) 為避免污染藥品，使用時勿碰觸藥瓶瓶口，並避免與他人共用，或以其他容器承裝。

(七) 如需同時使用兩種以上眼藥時，請依下列方式使用，以免影響藥效:

1. **使用眼藥水與眼藥膏時，請先使用藥水，間隔 10 分鐘以上再用藥膏**
2. **使用兩種眼藥水時，建議間隔 5 分鐘以上。**

(八)配戴隱形眼鏡時，請勿使用含防腐劑之眼藥水

【用法用量】

醫師藥師藥劑生指示藥品。

一天 3 至 4 次	每次 1 至 2 滴。

【警語】

一、 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

(一)連續使用三天症狀沒有改善。

(二)使用後產生眼睛劇痛、持續視力模糊或眼睛持續發紅、腫、熱、刺激感。

(三) 若有任何不適情況產生

【包裝】

100 毫升以下塑膠瓶裝。

內衛藥製字第 012072 號

麥迪森醫藥股份有限公司
公　司：臺北市中正區林森南路10號5樓
桃園廠：桃園市桃園區桃鶯路445-2號1樓