內衛藥製字第 013187 號

感克敏® 膠 囊
Conterin® Capsules

感克敏膠囊含 Chlorpheniramine Maleate 為抗組織胺劑；Pseudoephedrine Hydrochloride 可解除鼻塞；Belladonna alkaloids 可緩解流鼻水，Caffeine Anhydrous 可緩解鼻炎所引起的頭重感。

【主要成份】

Each capsule contains:

Belladonna total alkaloids. .....0.2 mg

Chlorpheniramine maleate.....2 mg

Pseudoephedrine hydrochloride ..... 50 mg

Caffeine anhydrous..... 30 mg

【賦 形 劑】

Lactose、Calcium Phosphate Dibasic、Talc、Magnesium Stearate、NU Pareil、Hydroxypropyl Cellulose L、New Coccine、Tartrazine、Eudragit-L100、Triethyl Citrate

【膠囊成份】

Gelatin、Sodium Lauryl Sulfate、New Coccin、Brilliant Blue FCF

【適 應 症】

緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(鼻塞、流鼻水、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)。

【用法用量】

醫師藥師藥劑生指示藥品。

成人每次一粒，每日三次。

【注意事項】

一、為防止兒童誤食請妥善保管。

二、避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。

三、除非有醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。

四、勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。

【警 語】

一、 服用本藥後，可能引起倦怠感、口乾，偶有視覺上之困擾，偶見興奮反應（以幼兒及老年人較常見）。

二、 除非醫師處方，嚴重之代謝性肝腎疾病患者不得服用。

三、 除非有醫師藥師藥劑生指示，曾經因本類藥物引起過敏症狀者不得服用。

四、 除非有醫師藥師藥劑生指示，曾經有心機能障礙、高血壓、糖尿病、甲狀腺機能亢進、腎機能障礙症狀者不得服用。

五、 老年人應小心使用本藥，7 歲以下不建議服用。

六、 如有呼吸之毛病或慢性支氣管炎、青光眼、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難或因前列腺腫大引起之排尿困難患者，請勿服用。

七、 服用本藥不得與酒精性飲料合用。

八、 除非有醫師藥師藥劑生指示，不得併用鎮靜劑或安眠劑等。

九、 服用本藥後，可能引起嗜睡現象，勿駕車或操作危險器械。

十、 連續服用本藥數日後，如果症狀沒有改善，應停藥立即就醫。

十一、 不得與其他含有抗組織胺成分或鼻充血解除成分之內服製劑共用(如綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鎮暈藥、鼻炎藥物或抗過敏藥等）。

十二、 本藥含 Pseudoephedrine hydrochloride，應注意下列事項：

（一）除非有醫師藥師藥劑生指示，有心臟病、高血壓、甲狀腺疾病、糖尿病、前列腺腫大引起之排尿困難者不得服用本藥。

（二）服用 Monoamine oxidase inhibitor（MAOI）期間，或停用 MAOI 兩星期內，不得服用本藥，如不了解服用之藥物是否含有 MAOI，請詢問醫師或藥師。

十三、本藥含咖啡因類成分，應限制再服用含咖啡因藥品、飲料（如：茶、咖啡、可樂等），過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心搏過速。

【包裝】6~21 粒鋁箔盒裝。

【儲存條件】儲存於 25℃以下。

瑞士藥廠股份有限公司
SWISS PHARMACEUTICAL CO., LTD.
新市廠：台南市新市區中山路182號