內衛藥製字第 014027 號

鎮咳劑

“明德” 漢路治嗽散

Aremin Powder

【成　　分】: 每公克含

Noscapine·····100mg

【構　　造】: 依文獻記載

2-methyk-8-methoxy-6，7-methyylcnedioxy—1-[6’ 7’ -dimethyloxy-phthelidyl-(3’)]1，2，3，4-tetrahydroisoquinoline

【性　　狀】:

本品為白色粉末，無味無臭，融點 174-176° C，在空氣中及光線中很安定，其在正常狀態無吸濕性。

【藥理作用】: 依文獻記載

本品對支氣管平滑肌有輕微的弛緩作用，本品對咳嗽中樞有鎮靜作用並能緩解各型咳嗽，對支氣管平滑肌有輕微的弛緩性，所以具有鎮咳之效能。

【適 應 症】: 鎮咳。

【用法用量】:

一天 3 次。

成人每次 200 毫克，12 歲以上適用成人劑量；

6 歲以上未滿 12 歲，每次 100 毫克；

3 歲以上未滿 6 歲，每次 50 毫克；

3 歲以下之嬰幼兒，請洽醫師診治。

檢附 0.5 公克量匙乙支（等同本品成分 500 毫克）。

【注意事項】:

一、為防止兒童誤食，本藥請妥善保管。

二、避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。

三、除非有醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。

四、勿超過建議劑量。

五、服藥後若有不適情況發生，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。

六、本藥不得與含酒精飲料併服。

【警　　語】:

一、吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾患（包括如慢性支氣管炎、肺氣腫）所引起之咳嗽，及伴有濃痰之咳嗽病人請勿自行使用。

二、有高燒、出疹、持續性頭痛，及持續達一星期以上之咳嗽，或有復發現象，應洽醫師。

三、除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：

（一）3 歲以下，請洽醫師診治。

（二）曾經因本藥物引起過敏症狀者不得使用。

四、本品含阿斯巴甜(Aspartame)賦形劑，苯酮尿症患者(Phenylketonurics)不宜使用。

【包　　裝】:

1.2～1000gm 以下塑膠瓶裝。

【賦 形 劑】:

Corn Starch、Mannitol、Magnesium Oxide、Menthol、Aspartame

明德製藥股份有限公司

桃園市楊梅區民富路二段 360 號