

強 心 利 尿 劑

利 心 寧 注射液

Diphyllin Injection

【劑型、含量】注射液，每 2 mL 含：

Dihydroxypropyltheophylline Eisai.....300mg
Calcium Chloride、Water for injection。

【特點】

1. 本劑較向來所使用的 Aminophylline 作用力更強，毒性及副作用較小而在連續 30 日間之使用殆無發現對腎臟有任何副作用。
2. 擴張冠狀動脈，及末梢血管對咳嗽、氣喘、疝痛，也有著效。

【適應症】

氣喘及支氣管痙攣。

【用法用量】

通常成人一日 1~2 次，每次一支(2mL)，注射於肌肉內。
本劑限由醫師使用。

【注意事項】

嚴重的心臟疾病、高血壓、甲狀腺機能亢進或急性的心肌損傷，充血性心臟衰弱等患者，要小心使用。

【禁忌】本品不得與其他 Xanthine 類製劑同時投與。

【警告】使用過高的劑量給予治療氣喘病連續狀態，可被預料會有毒性反應。

【孕婦】安全性未被認定前，不要使用。

【副作用】胃腸道：反應過敏、噁心、嘔吐和腹上部疼痛、嘔血、腹瀉。

中樞神經系：刺激、暴躁、失眠、反射性易激動、肌肉痙攣。

心臟血管系：悸動、心博過速、面紅、留意低血壓和循環的衰弱。

呼吸系：呼吸促迫、呼吸妨礙。

腎：尿蛋白、增加腎小管和紅血球細胞的排泄。

其他：發熱、失水。

【包裝】2 公撮 10、50、100 等安瓿裝。

【儲存條件】請放置於 25°C 以下貯存之。

委託者：**大安化學製藥股份有限公司**

公 司：台南市勝利路 473 號 TEL：(06)2328797

製造廠：台灣派頓化學製藥股份有限公司

高雄市岡山區為隨里為隨東路 50 號