# "南光"利濟痛注射液

## LIZUTON Injection"N.K."

## 內衛藥製字第 015413 號

本劑係鎮痛劑中最常用之 Pyrabital 配合 Sulpyrin 以加強其鎮痛作用，再加配神經系之強壯興奮劑 Caffeine & Sodium Salicylate 及 Barbital 系中功效最優良之 Allobarbital 以綜合之相乘作用，期能迅速發揮卓效，以達到鎮痛效果。

「成分」:本劑每 2ml 中含有:

| | |
|---|---|
| Sulpyrin | 200mg |
| Pyrabital | 150mg |
| Caffeine & Sodium Salicylate | 100mg |
| Allobarbital | 20mg |
| Taurin | 20mg |
| Benzyl Alcohol | 20mg |
| Water for injection added to make | 2ml |

「適應症」:

三叉神經痛、肋間神經痛、肌肉痛、肩肌凝固、結核症之解熱及鎮痛、開刀後之疼痛、打撲痛、骨折痛、坐骨神經痛、頭痛。

「用法用量」:

成人通常一日 1~2 次，每次 2ml 注射於皮下，肌肉內，靜脈內，可與葡萄糖或柳溴糖鈣等混合使用，使用時請盡能徐緩注射。限由醫師使用。

「注意事項」:

(1)為預防過敏症發生，使用前醫生須對病人仔細問診。

(2)注射後須仔細觀察患者狀況，留意有否副作用發生。對患有高燒之幼兒及高齡或體質衰弱病人，使用後尤須注意體溫過度下降、虛脫、四肢冷卻等症狀。

(3)對比林系過敏者禁用。

(4)對下列患者須慎重投與。

a.本人或其血親(雙親、兄弟姊妹)曾患有蕁麻疹、支氣管氣喘、過敏性鼻炎、食物或藥物過敏者。

b.肝腎障害患者。

c.血液障礙患者(如患貧血、白血球減少等)。

(5)當有下列副作用發生時，需立刻停藥，並給予適當處置:

a.休克:罕見休克症狀，有胸內苦悶、血壓低下、顏面蒼白、脈搏異常、呼吸困難等症狀。

b.過敏症:有時會有發疹、紅斑、浮腫、小疤性角膜炎，結膜炎、搔癢，以及罕見之剝落性皮膚炎、stevens-johnson 症候群(發熱、皮膚及黏膜發疹、紅斑、壞死性結膜炎等)症候群。

c.血液:有時會有再生不良性貧血、顆粒性白血球缺乏血小板減少以及貧血等症狀。

d.肝臟:罕見黃疸發生，當患者之 GOT,GPT 值上昇時，必須立刻停藥。

e.腎臟:罕見腎障害發生。

f.消化器官:胃痛、食慾不振、噁心、嘔吐、下痢。

g.其他:有時會發生頭痛、倦怠。

(6)注射時須注意下列事項:

a.皮下或肌肉內注射，宜注意神經麻痺或結硬塊現象，此對小兒高齡及衰弱患者尤須注意。

b.注射部位需避開神經經過地方，尤其是橈骨神經、尺骨神經、坐骨神經等。

c.須避免在同一部位注射;對小兒則不可連續使用。

d.打入注射針後若有痛感或血液逆流現象，需立刻拔出針頭另換注射部位。

e.對小兒、高齡及衰弱患者，使用濃度 10%之製劑，可用 5%葡萄糖液或注射用蒸餾水稀釋至所欲濃度。

(7)孕婦投與:因動物實驗有催畸之報告，對於孕婦或可能懷孕之婦女，不可使用。

「包裝」:

2ml×10A,2ml×100A,2ml×200A

南光化學製藥股份有限公司
台灣 台南縣新化鎮中山路1001號
TEL:06-5984121(代表) FAX：06-5972033