“應元”硫酸克耐黴素注射液

Kanamycin Sulfate Injection “Y.Y.”

【成分】Each ml contains：

Kanamycin Sulfate……250mg(力價)

賦形劑：

Sodium bisulfite，Sodium citrate，Rongalite，Methyl Paraben，Propyl Paraben，Benzyl alcohol，Water for Injection。

【作用】

本劑對於多數革蘭氏陽性菌陰性菌結核菌有抗菌作用及防禦感染效果。對於其他抗生物質獲有耐性之葡萄菌大腸菌或赤痢菌及對於鏈黴素 PAS，INAH 獲有耐性之結核菌。本劑能發揮抗菌作用。對於綠膿菌，變形菌感染症亦有效果，本劑注射肌肉內，吸收迅速於一小時後呈現最高之血中濃度分佈於各器官內。主要經由腎臟排泄，24 小時由尿中排泄 50%。

【適應症】

結核症、喉頭炎、扁桃腺炎、支氣管炎、肺炎、尿道炎、膀胱炎、急性腎盂炎。

【用法用量】

行肌肉注射

1. 一般性感染症：成人一日 4.8ml(1.2gm 力價)，小兒一日體重每公斤 30~50mg(力價)分 1~2 次行肌肉深部注射。
2. 結核症：(1)通常一日 8ml(2gm 力價)分二次注射，一星期 4gm(力價)分二次使用。
   (2)重症者：最初一日 4ml(1gm)，一星期 2~3 日使用，不論輕重症患者皆請並用 PAS 使用。

【注意事項】

1. 本藥限由醫師使用
2. 本劑在短期間投藥時，偶有腹瀉、注射局部疼痛、頭痛及感覺發麻等現象。
3. 長期使用，尤其每週使用量超過 6g 或總使用量達 50～70g 時，可能引起第 8 腦神經之障礙，如高音部聽覺障礙、耳鳴、眩暈等。如有此等症狀發生時，應即停藥。非不得已須繼續使用本劑時，請慎重之。
4. 使用本劑時，可能導致腎機能障礙。故腎機能障礙發生時，請即停藥，而腎機能不全患者如須使用本劑時，應慎重之。
5. 連續使用時，請儘可能變更注射部位。
6. 與其他藥劑之混溶常會導致著色或力價減低，請避免。
7. 本劑爲無色或微黃色澄清液，色澤有時多少有所增加，但對使用無妨。

【貯存】

請置於 25℃以下貯存。

【包裝】

4、10 毫升小瓶裝，100 支以下盒裝。

應元化學製藥股份有限公司
台灣台南市安平工業區新忠路 26 號　TEL：(06) 2654883（代表號）