S-133

內衛成製字第0714號

“應元”健胃錠

Stomachicus Tablets “Y.Y.”

94. 5

【成　　分】

Each tablet contains:

Sodium Bicarbonate	170mg
Gentian Powder	40mg
Cinnamon Powder	40mg
Glycyrrhiza Powder	80mg
Magnesium Carbonate	70mg

【適 應 症】

苦味健胃劑。

【用法用量】

通常成人一次4錠。一日三次。

【注意事項】

1.爲防止兒童誤食請妥善保管。
2.避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3.除非醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
4.勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。

【警　　語】

一、除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：
　1.對於牛奶或乳製品耐受度低者，每日服用藥品中之乳糖含量不得超過5g。
　2.未滿3個月之嬰兒不得服用。
　3.本藥每日最大建議劑量之含鎂量超過50mEq(0.6g)，腎疾患者不要服用。
　4.本藥每日最大建議劑量之含鈉量超過5mEq(0.115g)，須限鹽飲食之患者不要服用。
　5.一天內不可服用超過一日最大劑量，也不可連續服用一日最大劑量兩週以上。
　6.制酸劑不得併用其他藥品。
二、如有慢性胃痛、胃部不適或灼熱感，應先就醫確定診斷後再行服用。
三、消化道潰瘍患者應先就醫，不要自行服藥。
四、本藥含鎂之制酸成分可能會引起腹瀉。
五、本藥含碳酸鹽(或碳酸氫鹽)之制酸成分，可能引起腹脹、打嗝。
六、本藥含碳酸氫鈉會引起腹脹、打嗝；如長期與鈣質牛奶併用，會引起高血鈣、腎衰竭、鹼中毒、噁心、嘔吐、頭痛、意識不清、厭食等現象；腎臟病患者使用高劑量會引起鹼中毒；會加重高血壓、心衰竭、腎衰竭、水腫、腹水。有高血壓、心臟病、腎疾、腹水、水腫之患者禁止使用。

【包　　裝】

24～1000 錠 瓶裝。

衛生福利部
章縫綺
(26)
處 政

應元化學製藥股份有限公司
台灣台南市安平工業區新忠路 26 號・TEL:(06)2654883(代表號)