皮速平
BESALBENOL

內衛成製字第 000983 號

本品是由碘酊，配合解質溶解藥物組成，殺菌力極強，用以治療寄生性皮膚病及癬類、香港腳等卓具療效。

【成分】Each 100 ml contains：

Chlorobutanol……5gm
Benzoic Acid……4gm
Salicylic Acid……6gm
Compound Tincture Benzoin……10ml

賦形劑：Alcohol、Glycerin、B-Naphthol

【適 應 症】：香港腳(水蟲病)、金錢癬、灰指甲、牛皮癬、白癬、黴菌性皮膚病。

【用法用量】：患部先予洗淨擦乾後，再施予本藥於患部，一日數次視需要調整。

【類　　別】：成藥。

【注意事項】

1.須置於小孩接觸不到之處。
2.避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3.兒童、孕婦及授乳婦不建議自行使用。
4.若有副作用產生，應立即停藥就醫。
5.本製劑限於皮膚外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得施於眼睛四周或黏膜。
6.本製劑勿使用於大面積之體表或皮膚深部感染。
7.使用後自覺狀況未改善或更惡化，應立即停藥並就醫。
8.使用皮膚外用藥後請勿覆蓋，以免增加副作用。
9.塗抹皮膚外用藥後應徹底洗淨雙手後，再戴隱形眼鏡。
10.深部皮膚組織感染請就醫治療。
11.黴菌治療至少二星期，使用此藥須完成全程療效。
12.一般黴菌治療一星期症狀會改善，股癬和體癬經二星期，足癬經四星期治療症狀若沒有改善應停藥立即就醫，即使若症狀有改善停藥後若病情復發應停藥立即就醫。
13.若有糜爛之傷口時請勿使用。
14.本品應存於陰涼處，慎勿接近火氣。

【副作用】Salicylic Acid：紅斑、搔癢、刺痛感、水楊酸反應(耳鳴、暈眩、噁心、嘔吐等)。

【警　　語】

1.對本品所含藥物成分過敏者不得使用。
2.碘過敏者不能使用。
3.有全身性吸收之可能性，因此反覆使用新生兒可能出現甲狀腺功能低下，孕婦及其胎兒及授乳婦有造成甲狀腺腫及甲狀腺功能低下。
4.大範圍及長期使用會造成水楊酸效應(耳鳴、暈眩、噁心、嘔吐等)。
5.避免觸碰衣物、塑膠品、木材、金屬等。
6.不要觸碰眼部、臉部、陰部、黏膜。

【包　　裝】15、100 公撮瓶裝。

【儲存條件】30℃以下，避光儲存。

健康化學製藥股份有限公司
HEALTH CHEMICAL PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
台中市大甲區幼獅工業區幼四路 12 號
電話：04-26811733　　傳真：04-26818462