

# 克黴膚乳膏

## Comafu Cream

**【成分】**每公克乳膏含

<b>【主成份】</b>	Bifonazole.....	10mg
	Methylparaben.....	0.2 mg
	Propyl Paraben.....	0.2 mg

**【賦形劑】**

Stearic acid、Cetanol、Tween 60、Polysorbate 60、Mineral oil、Isopropyl Myristate、Propylene Glycol、Silicone oil、Perfume、Purified Water.

**【性質】**

Bifonazole是imidazole的衍生物，具廣效抗黴菌效果，對於皮膚真菌屬、酵母菌屬、黴菌及其他種真菌如Malassezia fufur皆具有確實的療效。此外，它對於Corynebacterium minutissimum 亦具療效。

Bifonazole在兩個不同階段抑制ergosterol的生化合成，與其他從azole衍生物而來的或是其他只作用在單一階段的抗黴菌劑是不同的。抑制ergosterol合成而導致胞體漿的細胞膜結構及功能上的破壞。

**【適應症】**

由皮膚真菌屬、酵母菌屬、黴菌及其他種真菌所引起之感染症。

**「說明」**

例如Malassezia fufur與Corynebacterium minutissimum，其中如tinea pedum、tinea manuum、tinea corporis、tinea inguinatis所引起之皮膚感染症，以及變色糠疹（汗斑）、表皮念珠菌症與紅癬。

**【禁忌】**

對bifonazole、cetostearyl alcohol或本品其他成分過敏者禁用本藥物。懷孕及哺乳期之使用於臨床前的安全試驗與人類藥物動力學試驗中，並無資料顯示出懷孕期間使用Bifonazole造成對母體與嬰孩的傷害。但目前並無臨床資料可供參考，因此，懷孕期的前三個月必須有醫師的指導才可使用Bifonazole。

**【不良反應】**依文獻記載

根據所有局部用bifonazole製劑的臨床研究及上市後調查，其最常見的不良反應依COSTART和頻率分類如下：(n=36351個病人，至1998.11.30為止)

發生頻率 $\geq 0.01\%$ 且 $<0.1\%$

全身性 過敏反應

發生頻率 $\geq 0.1\%$ 且 $<1\%$

全身性 疼痛

皮膚及附屬結構 接觸性皮膚炎、濕疹、搔癢、皮疹（水庖）、皮膚乾燥、皮膚病變這些副作用在停藥後即會消失。

**【交互作用】**

未知。

**【用法用量】**『本藥須由醫師處方使用』

每日使用一次，最好於就寢前使用。將本劑薄薄塗於皮膚患病部位，輕輕摩擦入皮膚。

為達到長期治療的目的，以本品治療必須持續且達到適當期間。

一般療程如下：

**指間黴菌病、香港腳**

(tinea corporis、tinea manuum、tinea interdigitalis)

3星期

身體軀幹、雙手、皮膚皺摺部位之真菌感染

(tinea corporis、tinea manuum、tinea inguinatis)

2~3星期

變色糠疹（汗斑）、紅癬

2星期

表皮念珠菌症

2~4星期

若感染部位大小如手掌一般，通常塗上大約一公分長的乳膏。

**【孩童使用】**

並無孩童使用的深入研究。從臨床資料的評估報告，沒有預見對孩童有傷害。但嬰兒必須在醫師監控下才能使用bifonazole。

**【注意事項】**

置於孩童無法觸及之處。

請勿使用過期的。

避免觸及眼睛。

『本藥須由醫師處方使用』

**【包裝】**1000公克以下塑膠瓶裝、鋁軟管裝。

Sentai

製造廠：仙台藥品工業股份有限公司

廠址：臺南市新營區新工路35號