

“永豐” 妥內散酸注射液 50毫克/毫升  
Tranexamic acid Injection 50mg/mL “YF”

【成分】 Each mL contains :  
Tranexamic acid ..... 50 mg  
賦形劑：Water for injection。

【作用】 1. 抗Plasmin作用：Tranexamic acid能阻止Plasminogen Activator與Plasmin之作用，其特別對Plasminogen Activator具阻止作用。  
2. 止血作用：當Plasmin異常亢進時，Fibrin會輕易的被分解，血小板之凝集作用也會被阻止。使用Tranexamic acid時，可以阻止Fibrin的被分解及抑制血管之脆弱化，而得到止血的效果。  
3. 抗過敏、抗炎症作用：Tranexamic acid對kinin或其他活性的Peptide等引起之血管透過性亢進，過敏性炎症性病變(即Plasmin)具有抑制作用，臨床上可以改善皮膚疾病，咽喉頭疾病之腫脹、發赤、搔癢等症狀。

【適應症】 全身及局部出血或出血性疾病。

【用法用量】

1. 注射：通常成人1日250mg~500mg (5~10mL)，一日分1~2次靜脈或肌肉注射。
2. 手術中、手術後必要可1次500mg~1000mg (10~20mL)靜脈注射，或者可以500mg~2500mg (10~50mL)靜脈點滴注射。
3. 以上用量視年齡症狀可適當增減之。

本藥限由醫師使用。

- 【注意事項】 1. 需緩慢靜脈注射（過速有引起噁心，胸部不快感，心悸亢進，血壓下降等現象）。  
2. 應避免注射於神經行走部位，多次投與時應左右交替注射，對嬰兒之注射特別注意。  
3. 對血栓之病患(腦血栓、血栓性靜脈炎等)及可能引起血栓之病人應慎重投與。  
4. 副作用：噁心、食慾不振、下痢胸部不快感，皮膚搔癢、發疹、偶有輕微睡意。

※本品如發現溶液不清淨、或密封不完整時，請勿使用。

【儲存條件】 本品應於室溫30°C以下避光儲存。

【包裝】 塑膠安瓿 5mL、10mL、20mL/100支以下盒裝。  
衛部藥製字第058274號